Nationalpark Hohe Tauern –Tag der Artenvielfalt 2017

14. bis 16. Juli 2017 – Hinteres Defereggental (Osttirol)

Ergebnisbericht

Impressum

Für den Inhalt verantwortlich: Haus der Natur und Nationalpark Hohe Tauern
Nationalparkrat Hohe Tauern, Kirchplatz 2, 9971 Matrei i.O.

Redaktion: Patrick Gros & Robert Lindner, Haus der Natur, Salzburg

TAV-Koordination und Organisation: Martin Kurzthaler (Nationalpark Hohe Tauern Osttirol), Patrick Gros (Haus der Natur)

Titelbild: Patschertal (Foto: Christine Medicus).

Basierend auf den Detailberichten von (alphabetisch)

Gernot Friebes

Patrick Gros

Till R. Lohmeyer

Johann Neumayer

Jakob Pöhacker

Thomas Rücker

Thomas Rupp

Martin Schlager

Roman Türk

Walter Wallner

Helmut Wittmann

Gefördert aus Nationalpark-Mitteln des Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus sowie der Länder Kärnten, Salzburg und Tirol.

Zitiervorschlag:

GROS P. & R. LINDNER (2019): Nationalpark Hohe Tauern – Tag der Artenvielfalt 2017, 14. bis 16. Juli 2017 – Hinteres Defereggental (Osttirol). Ergebnisbericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern. Haus der Natur, Salzburg: 71 Seiten.

Salzburg, Juni 2020, Version 1.2

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	1
Methodik	2
a. Untersuchungsgebiet	2
b. Zoneneinteilung.....	3
c. Teilnehmende Expert/-innen	5
d. Bearbeitete Organismengruppen	5
e. Ablauf des Tages der Artenvielfalt 2017	6
Ergebnisse.....	7
Pilze.....	9
Flechten.....	16
Moose.....	20
Jochalgen	24
Blütenpflanzen und Farne	25
Schmetterlinge.....	41
Hautflügler	49
Heuschrecken.....	51
Käfer	55
Diverse Insekten (Libellen, Zweiflügler - Tipuloidea).....	57
Spinnentiere	58
Amphibien, Reptilien, Fische und Weichtiere	60
Vögel.....	62
Säugetiere	64
Literatur- und Quellenverzeichnis.....	67
Zusammenfassung	70

Einleitung

Der Nationalpark Hohe Tauern ist mit 1.856 km² das größte Schutzgebiet in den europäischen Alpen. Bedingt durch seine Größe und seine Lage, beherbergt der Nationalpark Hohe Tauern eine bemerkenswert hohe Anzahl an Tier- und Pflanzenarten. Mehr als ein Drittel aller in Österreich nachgewiesenen Pflanzenarten und etwa die Hälfte der österreichischen Wirbeltierarten kommt hier vor.

Der Nationalpark Hohe Tauern bekennt sich in seinem „Forschungskonzept 2020“ (BAUCH et al. 2007) dazu, den Kenntnisstand über die Vielfalt der Lebewesen innerhalb seiner Schutzgebietsgrenzen systematisch zu erweitern. Gleichzeitig ist den Verantwortlichen bewusst, dass die flächendeckende Erfassung der Biodiversität eines derart großflächigen Gebietes realistischerweise nicht durchführbar ist. Um dennoch zumindest ansatzweise die Artenvielfalt des Gebietes zu erfassen und zu dokumentieren setzt der Nationalpark Hohe Tauern auf folgende Strategie. Die Tage der Artenvielfalt stellen eine Möglichkeit zur fokussierten Erfassung einzelner Modellgebiete dar. Darüber hinaus werden laufend Spezialerhebungen durchgeführt in deren Mittelpunkt einzelne Schutzinhalte oder Managementaufgaben stehen. Die Dokumentation der Ergebnisse aus den Tagen der Artenvielfalt sowie aus weiteren Forschungsprojekten erfolgt mit Hilfe einer auf BioOffice basierten Biodiversitätsdatenbank, die seit 2002 in Kooperation mit dem Salzburger Haus der Natur geführt wird. Mit Stand Mai 2019 sind in der Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern 387.638 Sammlungs-, Beobachtungs- und Literaturdaten von 12.760 Taxa (Arten und untergeordnete systematische Einheiten) dokumentiert.

Nach dem Erfolg der bereits durchgeführten "Nationalpark Hohe Tauern Tage der Artenvielfalt" (vgl. GROS et al. 2007, 2009, 2010, 2012a, 2012b, 2015, GROS 2016, GROS & LINDNER 2017a, 2017b, 2018) wurde **2017 der elfte "Nationalpark Hohe Tauern Tag der Artenvielfalt" im Oberen Defereggental in Osttirol** durchgeführt.

Abbildung 1: Die blüten- und krautreiche Landschaft des Schwarzachtals bildet ein Eldorado für alpine Insekten (Foto: Patrick Gros)

Methodik

a. Untersuchungsgebiet

Der Tiroler Anteil am Nationalpark Hohe Tauern feierte 2017 sein 25jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass fand der Tag der Artenvielfalt in diesem Jahr im Hinteren Defereggental statt. Das Patschertal sowie das Gebiet um die besonders sehenswerte Jagdhausalm zeichnen sich durch besondere Naturnähe und landschaftliche Schönheit aus. Auch zahlreiche Spuren menschlichen Wirkens über Jahrhunderte finden sich in den Tallagen, unter anderem kilometerlange Klaubsteinmauern, welche zahlreichen Kleintieren Schutz und Lebensraum bieten. Die Jagdhausalm selbst zählt zu den ältesten Almen Österreichs. Die Abgeschiedenheit und vor allem auch die Bauweise der urtümlichen Almhütten erinnern an Bergdörfer des Himalayas. Der Oberhauser Zirbenwald ist der größte, in sich geschlossene Zirbenwald der Ostalpen und birgt eine Fülle von unterschiedlichen, kleinräumigen Waldgesellschaften. Im Schwarzachtal breiten sich schön ausgeprägte Flussalluvione aus, und den Talschluss bilden Schuttkegel der beeindruckenden, gletscherbedeckten Rötspitze (3.495 m). Ein Großteil des Gebietes ist mit Fahrzeugen erreichbar, ein Almweg führt über das Klammljoch (2.300 m) ins benachbarte Südtirol.

Fauna und Flora des Untersuchungsgebietes waren vor dem Tag der Artenvielfalt mäßig gut dokumentiert. Für das Hintere Defereggental waren in der **Biodiversitätsdatenbank** des Nationalparks Hohe Tauern damals **887** verschiedene Arten verzeichnet (Stand 05/2019).

Abbildung 2: Das Gebiet der Jagdhausalm im unteren Arvental (Foto: NPHT).

b. Zoneneinteilung

Beim Tag der Artenvielfalt 2017 wurden aufgrund der beträchtlichen Flächengröße des Untersuchungsgebiets lediglich 4 Zonen unterschieden, die der groben Orientierung dienen sollten.

Zone 1: Oberhaus – Jagdhausalm (1.700 m – 2000 m)

Gemütlicher, mäßig ansteigender Almweg vom Parkplatz Oberhaus durch die Untere und Obere Seebachalm zu den uralten Hütten der Jagdhausalmen. Reine Gehzeit ca. 2 Stunden. Unterwegs Oberhauser Zirbenwald, ausgedehnte Almböden und sehr lange, alte Klaubsteinmauern, welche stets repariert und niemals dem Verfall preisgegeben wurden. Auch erst kürzlich errichtete Mauern vorhanden.

Klaubsteinmauer Seebachalm

Oberhauser Zirbenwald

Jagdhausalmen

Zone 2: Jagdhausalm – Schwarzachtal (2000 m – 2430 m)

Einfacher Alm- bzw. Wanderweg, Klaubsteinmauern, Trockenrasen, Flussalluvione, Schotterhalden, Grobblockhalden, Gletschervorfeld. Gehzeit einfach – ca. 2,5 Std.

Schwarzachtal

Frauenmantel-Almanger

Zone 3: Jagdhausalmen – Arvental – Klammljoch (2000 m – 2.300 m)

Leicht ansteigender Almweg, Almwiesen, Feuchtfächen, Niedermoore, Blockhalden, Gehzeit 2 Std.

Almweg zur Arvental-Alm

Jausenstation Arvental - Alm

Zone 4: Patscher Alm - Patscher Tal - Barmer Hütte (1.670 m – 2.610 m)

Bis zur Materialeilbahn Almweg, dann zeitweise recht steiler Wanderweg hinauf zur Barmerhütte. Bergwald, Niedermoore, Almwiesen, Grobblockhalden, Gletschervorfeld. Gehzeit 3,5 Std. Kondition und Trittsicherheit für den Aufstieg zur Barmerhütte notwendig.

Patschertal

Barmer Hütte

Für den Großteil der Fundmeldungen liegen genaue geografische Angaben - bis hin zu punktgenauen Koordinaten - innerhalb der vorgegebenen Zonen vor.

c. Teilnehmende Expert/-innen

Zusätzlich zum Organisationsteam des Nationalparks Hohe Tauern nahmen 91 Fachleute am Nationalpark Hohe Tauern Tag der Artenvielfalt 2017 teil (alphabetische Auflistung):

Aichhorn Ambros, Benedikt Eva, Böckelmann Reik, Brenner Gebhard, Brunner Evelyn, Buchner Andrea, Bull Matthias, Busse Annika, Czadek Otmar, Deutsch Helmut, Eckelt Andreas, Eigner Falco, Eigner Marko, Eigner Anett, Fischer Manfred, Fleischmann Peter, Franz Raimund, Franz Wilfried, Friebe Michaela, Friebe Gernot, Frischmann Sonja, Geiblinger Walter, Geissberger Merle, Gewolf Susanne, Gläser Jörg, Gollkowsky Volker, Grieshofer Jürgen, Gros Patrick, Hofbauer Wolfgang, Illich Inge, Jocher Patrick, Jung Michael, Kahlen Manfred, Keller Rudi, Kirchmair Gabriel, Koder Elisabeth, Kogler Gerlinde, Koren Toni, Künkele Ute, Laimer Claudia, Lanz Margarethe, Lenhof Vanessa, Lohmeyer Till. R., Lynn Bauer, Manke Nancy, Mayrhofer Roland, Medicus Christine, Medicus Reinhard, Meindl Hedwig, Meyer Maren, Mixanig Harald, Neumayer Johann, Nowotny Günther, Oertel Anke, Olbrich Maximilian, Ortner Siegfried, Peter Theodor, Plattner Sven, Pohla Hannes, Pohla Marinella, Rassinger Nina, Rassinger Bernd, Rupp Thomas, Schaarschmidt Michael, Schattaneck Petra, Schlagbauer Johannes, Schlager Martin, Schmidt Annika, Schwuhchow André, Seelaus Herbert, Seelaus Daniel, Spiess Werner, Stangelmaier Günter, Sternath Bettina, Stöhr Oliver, Ströhle Manfred, Stross Franz, Stüber Eberhart, Tolke Detlef, Tritthard Gertraud, Türk Roman, Vilgut Harald, Vilgut Manuel, Vogtenhuber Peter, Wallner Walter, Werner Anna, Wiesmair Benjamin, Winkler Ralph, Wittmann Helmut, Wittwer Susanne, Zadavec Mladen, Zinner Friederike.

d. Bearbeitete Organismengruppen

Wirbeltiere:

Säugetiere, Vögel, Fische, Reptilien und Amphibien.

Wirbellose Tiere:

Insbesondere Insekten: Libellen, Heuschrecken, Schmetterlinge, Zweiflügler, Hautflügler, Käfer, aber auch Spinnen- und Weichtiere.

Pflanzen und Pilze:

Blütenpflanzen und Farne, Moose, Algen, Flechten und Pilze.

Abbildung 3: Nationalpark Hohe Tauern Tag der Artenvielfalt 2017 – Hinteres Defereggental: Teilnehmende Expert/-innen – einzelne Expert/-innen mussten früher abreisen, und sind hier nicht abgebildet (Foto: Solvin Zankl).

e. Ablauf des Tages der Artenvielfalt 2017

Der Tag der Artenvielfalt 2017 fand zwischen 14. und 16. Juli 2017 statt. Wie 2015 und 2016 wurde die Möglichkeit angeboten, Artengruppen individuell und flexibel im Frühjahr bzw. im Herbst 2017 zu erheben, wenn der Haupttermin für deren Lebensphasen nicht optimal geeignet war. Einige Experten, darunter Pilzspezialisten, haben sich für diese Alternative entschieden. Beim Haupttermin wurden die Erhebungen durch Regenfälle teilweise erschwert, v. a. am 15. Juli. Wie die Ergebnisse zeigen (siehe folgendes Kapitel), wurden trotzdem viele Arten beobachtet, auch solche, die für das Hintere Defereggental neu waren!

Abbildung 4: Natürliche Berglandschaft aus dem Patschertal (Foto: Christine Medicus).

Ergebnisse

Vor dem Jahr 2017 enthielt die Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern 3.505 Datensätze über 887 verschiedene Taxa (Arten und untergeordnete systematische Einheiten) für das untersuchte Gebiet (*Stand 05/2019*) (siehe Tab. 1)!

Allein durch den "Nationalpark Hohe Tauern Tag der Artenvielfalt 2017" erfuhr die Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern einen Zuwachs von beinahe 5.600 Datensätzen. 1.542 verschiedene Taxa konnten im Rahmen des "Nationalpark Hohe Tauern Tages der Artenvielfalt" nachgewiesen werden (siehe Tab. 1), 1.434 davon allein im Bereich des eigentlichen Untersuchungsgebiets (Schwarzachtal westlich und nordwestlich Erlsbach). Nun sind insgesamt 1.886 Taxa aus dem Bereich des eigentlichen Untersuchungsgebiets in der Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern dokumentiert (*Stand 05/2019*).

Tabelle 1: Anzahl der für das untersuchte Gebiet in der Biodiversitätsdatenbank dokumentierten Taxa (Arten + untergeordnete systematische Einheiten) und Datensätze. **vor 2017** = vor dem Tag der Artenvielfalt 2017 erfasste Taxa/Datensätze; **TAV 2017** = im Zuge des Tages der Artenvielfalt 2017 nachgewiesene Taxa/Datensätze; **Gesamt** = nach dem Tag der Artenvielfalt 2017 insgesamt erfasste Taxa/Datensätze (**Stand 05/2019**). In Klammern werden die Zahlen aller im Zuge des Tages der Artenvielfalt 2017 nachgewiesenen Taxa angegeben (also unter Berücksichtigung der Daten, die auch außerhalb des eigentlichen Untersuchungsgebiets gesammelt wurden – in erster Linie im gesamten Defereggental, vereinzelt auch im angrenzenden Iseltal).

	Taxa			Datensätze		
	vor 2017	TAV 2017	Gesamt	vor 2017	TAV 2017	Gesamt
Pflanzen und Pilze						
Pilze	89	134 (150)	191	137	186	323
Flechten	359	139 (145)	404	1.033	226	1.259
Moose	46	205	231		259	259
Algen		23	23		31	31
Blütenpflanzen & Farne	262	479 (547)	524	1.465	2.682	4.147
Wirbellose						
Libellen		1	1		1	1
Heuschrecken	6	9 (12)	9	40	72	112
Schmetterlinge	24	249 (255)	251	40	1.213	1.253
Hautflügler	15	20	29	31	187	218
Zweiflügler		6	6		6	6
Käfer	1	68	69	1	132	133
Spinnentiere		32	32		54	54
Schnecken		1	1		1	1
Wirbeltiere						
Amphibien & Reptilien	6	3 (4)	6	15	53	68
Fische		2	2		3	3
Vögel	60	52 (60)	82	442	428	870
Säugetiere	19	11	25	301	57	358
Gesamt	887	1.434	1.886	3.505	5.591	9.096

Abbildung 5: Lage der Fundorte (gelbe Punkte), die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 angelegt wurden (Grafik: Haus der Natur, Peter Kaufmann).

Helmut Wittmann & Thomas Rücker / Till R. Lohmeyer & Gernot Friebes

Nachgewiesene Taxa: 134 (150) – siehe Tab. 1

Dokumentierte Einzelnachweise: 186

Expert/-innen: Friebes Gernot, Friebes Michaela, Künkele Ute, Lohmeyer Till R., Wittmann Helmut

Zum Nachweis des Arktischen Wiesen-Champignons (*Agaricus aristocratus*) im Schwarzachtal (Helmut Wittmann & Thomas Rücker)

Von H. Wittmann wurde am 15.7.2017 das sogenannte Hörnle nördlich der Jagdhausalmen und der nördlich daran angrenzende Höhenrücken Richtung Jagdhausspitze kartierend begangen. Beim weglosen Abstieg auf den ostexponierten Hängen des Schwarzachtals östlich vom Hörnle wurde neben anderen Pilzarten eine Champignonart mit mehreren Fotos dokumentiert. Das Vorkommen erstreckte sich über eine Höhenlage von ca. 2.450 bis 2.550 m Seehöhe. Der Lebensraum der Champignonart waren weidebeeinflusste alpine Rasen über saurem Untergrundgestein, wobei jedoch eine Reihe von Gefäßpflanzen auf einen gewissen basischen Einfluss hingewiesen haben. Ca. 10 bis 15 Fruchtkörper dieses Pilzes wurden im genannten Bereich beobachtet.

Beim Auswerten der Fotos wurde die Champignonart von Thomas Rücker sofort als Arktischer Wiesen-Champignon (*Agaricus aristocratus* Gulden) erkannt. In Abbildung 6 ist die Champignonart vom Fundort an den Abhängen des Hörnles dargestellt, wobei sie vor allem durch die intensiv rosa gefärbten Lamellen (beim Umdrehen des Pilzes) auffällt.

Die Farbe der Lamellen und der Habitus charakterisieren *A. aristocratus* als typischen Vertreter der *campestris* Gruppe. Diese aus Spitzbergen von Gulden beschriebene Art, wurde erstmals 1988 als *A. arcticus* vorgestellt (GULDEN & JENSEN 1988). Nachdem dieser Namen nicht gültig (nom. illeg.) ist wurde dieser Pilz von GULDEN 1996 als *A. aristocratus* publiziert (GULDEN & TORKELSEN 1996). Mit großer Wahrscheinlichkeit ist auch der Lange'sche *A. campestris* var. *arcticus* ident. Eine nahestehende Art ist *A. mollerinaus* Bon, in wie weit hier eine Konspezifität besteht, wäre durch weitere Aufsammlungen zu verifizieren (vgl. PARRA SÁNCHEZ 2008). *Agaricus aristocratus* ist eine hauptsächlich im hohen Norden vorkommende Art, von der nur wenige Nachweise aus dem gesamten Alpenraum vorliegen. So wird bei DÄMON & KRISAI-GREILHUBER (2016) ein ebenfalls mit einem Foto belegter Fund von knapp unterhalb des Gipfels des Großen Hafners (Hohe Tauern, Salzburg/Kärnten) in einer Seehöhe von 2.950 m angeführt wird. Dieser Nachweis wird im Kompendium „Die Pilze Österreichs“ (DÄMON & GREILHUBER 2016) als einer der höchstgelegenen Pilzfundorte Österreichs genannt. Bemerkenswerterweise fehlt die Art jedoch im Gesamtverzeichnis der Pilze Österreichs unter der Gattung *Agaricus* auf den Seiten 114 bis 116. Dieser Fund vom Großen Hafner hat mit dem Finder Wolfgang Dämon auch Eingang in die Biodiversitätsdatenbank am Haus der Natur (Nachweisdatum 27.8.2016) gefunden. In der Biodiversitätsdatenbank findet sich ein weiterer Fund dieser seltenen Champignonart aus dem Jahr 2013, wobei als Beobachter die „ARGE Österr. Pilzberater“ und als Fundort „Glocknerstraße, Fuscher Wegscheide (Hochtor)“ angegeben wird. Zusätzlich mit einem Fund in der Schweiz vom Piz Darlux (nördlich von St. Moritz) im internationalen Erfassungssystem für biologische Kartierungsdaten GBIF dürften damit um sämtliche Nachweise im gesamten Alpenraum aufgelistet sein. Ergänzend sei hervorgehoben, dass auch im Datenerfassungssystem Observation.org keine Funddaten von *Agaricus aristocratus* aus dem Alpenbogen enthalten sind.

Angesichts des Umstandes, dass an den ostexponierten Abhängen des Hörnles die Art gleich mehrfach entdeckt werden konnte, stellt sich die Frage, ob *Agaricus aristocratus* tatsächlich eine derartig extreme Seltenheit darstellt. So könnte es auch durchaus sein, dass die Art in Regionen weit über der Waldgrenze, die sicherlich nicht zum „primären Zielgebiet“ der Mykologen zählen, einfach übersehen oder unterkartiert ist. Jedenfalls wäre im Frühsommer

in höheren Lagen auf diese unter Einbeziehung des Lebensraumes relativ leicht erkennliche Art vermehrt zu achten.

Abbildung 6: Die rosafarbenen Lamellen auf der Hut-Unterseite machen *Agaricus aristocratus* in Kombination mit seinem hochalpinen Habitat nahezu unverwechselbar (Schwarzachtal, Ostabhang des Hörndls, ca. 2.500 msm, 15.7.2017) (Foto: Helmut Wittmann).

Weitere, bemerkenswerte Funde (Till R. Lohmeyer & Gernot Friebe)

Entoloma sericatum (Weiden-Rötling)

Die artenreiche Lamellenpilzgattung *Entoloma* (Rötlinge) ist gekennzeichnet durch eckige Sporen und rosa bis rosabräunlichen Sporenstaub. Davon abgesehen ist die Farb- und Formenvielfalt der Rötlinge nahezu unbegrenzt – neben großen und dickfleischigen Arten wie dem giftigen Riesenrötling (*Entoloma sinuatum*) gibt es solche mit kaum zentimeterbreiten Hüten und fadendünnen Stielchen. Nicht selten findet man sogar auffällig bunte Rötlinge mit blauen, grünen, gelben oder roten Farben.

Für den Weiden-Rötling, der in großer Stückzahl in einem für ihn typischen Umfeld, einem feuchten Weidengebüsch, beobachtet wurde, gibt es nach Angaben der österreichischen Pilz-Datenbank bisher noch keinen Nachweis aus Osttirol. Er gehört zu den mittelgroßen Arten mit im Schnitt mehlig-ranzig riechendem Fleisch und durchscheinend radialstreifigem Hutrand.

Cytidia salicina (Roter Weiden-Schichtpilz)

Im gleichen Gebüsch, in dem *Entoloma sericatum* (s. o.) wuchs, waren einige abgestorbene, aber noch ansitzende Weidenzweige mit den krustenförmigen, schon aus einigen Metern Entfernung wahrnehmbaren Fruchtkörpern des Roten Weiden-Schichtpilzes besetzt. Einmal gesehen, lässt sich der spektakuläre Pilz auch von mykologisch unerfahrenen Naturfreunden problemlos wiedererkennen. Die Art ist in feuchten Schluchtwäldern des Alpengebiets weit verbreitet und kann in Gebirgsbäche begleitenden Weidengebüschen gezielt gesucht werden. Ein gutes mikroskopisches Merkmal sind stark verästelte „Dendrohyphidien“ im Hymenium.

Leccinum piceinum (Fichten-Rotkappe)

Wenn frische Rotkappen Menschen begegnen, ist ihr Schicksal in den meisten Fällen besiegelt: Sie enden im Kochtopf und der Fressfeind freut sich. Begegnen sie dagegen einem Mykologen, sind die Überlebenschancen etwas größer: Der Fachmann hält inne, prüft die Begleitbäume, notiert die Verfärbung im Schnitt und auf Druck und betupft das Fleisch mit Eisensulfat. Kommt er zu dem Schluss, eine seltene Rotkappenart vor sich zu haben, begnügt er sich vielleicht mit einem Belegexemplar und verschont die anderen.

Rotkappen bilden Mykorrhiza-Verbindungen mit verschiedenen Partnerbäumen, namentlich Birken, Pappeln und Eichen. Unterschieden werden aber auch die Fuchsbraune Rotkappe (*Leccinum vulpinum*, vorwiegend unter Kiefern) und die Fichten-Rotkappe (meist, aber nicht ausschließlich, unter Fichte). Zu den Trennmerkmalen gehört u.a. die Fleischverfärbung im Schnitt (KLOFAC 2007). In Osttirol wurde die Fichten-Rotkappe laut österreichischer Pilz-Datenbank bisher nur im Raum Lienz festgestellt.

Abbildung 7: *Entoloma sericatum* (Weiden-Rötling) (Foto: Till R. Lohmeyer & Ute Künkele).

Abbildung 8: *Cytidia salicina* (Roter Weiden-Schichtpilz) (Foto: Till R. Lohmeyer & Ute Künkele).

Abbildung 9: *Leccinum piceinum* (Fichten-Rotkappe) (Foto: Till R. Lohmeyer & Ute Künkele).

Tabelle 2: Nachweise von Pilzen, die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Pilze)	Deutscher Name
Agaricaceae	Agaricus aristocratus Gulden	Arktischer Champignon
Agaricaceae	Lepiota cristata (Bolton : Fr.) P. Kumm.	Stink-Schirmling
Agaricaceae	Lepiota ventriospora D. A. Reid	Gelbwolliger Schirmling
Agryriaceae	Sarea resiniae (Fr. : Fr.) Kuntze	
Atheliaceae	Leptosporomyces fuscostratus (Burt) Hjortstam	
Atheliaceae	Leptosporomyces mutabilis (Bres.) Krieglst.	Veränderliche Gewebehaut
Bankeraceae	Hydnellum suaveolens (Scop. : Fr.) P. Karst.	Wohlriechender Korkstacheling
Bankeraceae	Sarcodon imbricatus (L. : Fr.) P. Karst.	Habichtspilz
Bolbitiaceae	Pholiotina rugosa (Peck) Singer	Runzeliger Glockenschüppling
Bolbitiaceae	Pholiotina vexans (P. D. Orton) Bon	
Boletaceae	Boletus edulis Bull. : Fr.	Steinpilz, Fichten-Steinpilz
Boletaceae	Imleria badia (Fr. : Fr.) Vizzini	Maronenröhrling, Kastanienbrauner Filzröhrling,
Boletaceae	Leccinum piceinum Pilát & Dermek	Fichten-Rotkappe
Boletaceae	Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Bon	Brauner Filz-Röhrling
Cantharellaceae	Cantharellus aurora (Batsch) Kuyper	Gelbe Kraterelle
Cantharellaceae	Cantharellus cibarius Fr. : Fr.	Pfifferling, Eierschwamm, Eierschwammerl
Clavariaceae	Clavulinopsis corniculata (Schaeff. : Fr.) Corner	Geweihförmiges Keulchen
Coprinaceae	Coprinopsis acuminata (Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo	Spitzbuckeliger Falten-Tintling, Schmalsporiger F.-T.
Coprinaceae	Coprinus lagopus (Fr. : Fr.) Fr.	Hasenpfote
Coprinaceae	Panaeolus acuminatus (Schaeff.) Gillet	Kegelige Düngerling
Coprinaceae	Panaeolus papilionaceus (Bull. : Fr.) Quéf.	Behangener Düngerling
Coprinaceae	Panaeolus semiovatus (Sowerby : Fr.) S. Lundell & Nannf.	Ring-Düngerling
Coprinaceae	Psathyrella spintrigera (Fr.) Konrad & Maubl.	Dattelbrauner Mürling
Corticiaceae	Cytidia salicina (Fr. : Fr.) Burt	Roter Weiden-Scheibenpilz
Cortinariaceae	Cortinarius flexipes Fr. non ss. Lindstr. & Melot	Violettlicher Gürtelfuß
Cortinariaceae	Cortinarius sanguineus (Wulfen : Fr.) Fr.	Blut-Hautkopf
Cortinariaceae	Cortinarius varius Fr.	Ziegelgelber Schleimkopf
Cortinariaceae	Cortinarius venetus (Fr.) Fr.	Grüner Raukopf
Cortinariaceae	Galerina camerina (Fr.) Kühner	Kleinsporiger Häubling
Cortinariaceae	Gymnopilus bellulus (Peck) Murrill	Hübscher Flämmling
Cortinariaceae	Gymnopilus picreus (Pers. : Fr.) P. Karst.	Rotbrauner Flämmling
Cortinariaceae	Gymnopilus sapineus (Fr. : Fr.) Maire	Tannen-Flämmling
Cortinariaceae	Inocybe geophylla (Fr. : Fr.) P. Kumm.	Erdblättriger Risspilz
Cortinariaceae	Inocybe grammata Quéf.	Höckerigsporiger Risspilz
Cortinariaceae	Inocybe napipes J. E. Lange	Rübenstieler Risspilz
Cortinariaceae	Inocybe soluta Velen.	Knollenloser Risspilz
Cortinariaceae	Inocybe spec.	
Cortinariaceae	Inocybe subcarpta Kühner & Boursier	Trapezsporiger Risspilz
Cortinariaceae	Inocybe tenebrosa Quéf.	Schwarzfüßiger Risspilz
Cudoniaceae	Spathularia flavida Pers. : Fr.	Dottergelber Spatelring
Entolomataceae	Clitopilus prunulus (Scop. : Fr.) P. Kumm.	Mehl-Räsling
Entolomataceae	Entoloma conferendum (Britzelm.) Noordel.	Kreuzsporiger Glöckling
Entolomataceae	Entoloma sericatum (Britzelm.) Sacc.	Weiden-Rötling
Entolomataceae	Rhodocybe melleopalens P. D. Orton	Honiggelber Tellerling
Exidiaceae	Exidia recisa (Ditmar : Fr.) Fr.	Kreisel-Drüsling
Exidiaceae	Pseudohydnum gelatinosum (Scop. : Fr.) P. Karst.	Gallertstacheling
Exidiaceae	Tremiscus helvelloides (DC. : Fr.) Donk	Fleischroter Gallertrichterling
Exobasidiaceae	Exobasidium rhododendri (Fuckel) Cramer	Alpenrosen-Nacktbasidie
Exobasidiaceae	Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin	Preiselbeer-Nacktbasidie
Fomitopsidaceae	Laricifomes officinalis (Vill. : Fr.) Kotl. & Pouzar	Bitterer Lärchen-Baumschwamm, Lärchenschwamm
Gloeophyllaceae	Gloeophyllum sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karst.	Zaun-Blätling
Gomphidiaceae	Chroogomphus helveticus (Singer) M. M. Moser	Filziger Gelbfuß
Gomphidiaceae	Chroogomphus helveticus (Singer) M. M. Moser ssp. tatrensis (Pilát) Kuthan &	Filziger Gelbfuß (ssp. tatrensis)
Gomphidiaceae	Chroogomphus rutilus (Schaeff. : Fr.) O. K. Mill.	Kupferroter Gelbfuß
Gomphidiaceae	Gomphidius glutinosus (Schaeff. : Fr.) Fr.	Kuhmaul, Großer Gelbfuß
Gomphidiaceae	Gomphidius maculatus (Scop.) Fr.	Fleckender Schmierling
Helotiaceae	Bisporella resinicola (Baranyay & A. Funk) S.E. Carp. & Seifert	
Hyaloscyphaceae	Lachnellula occidentalis (G. G. Hahn & Ayers) Dharne	Lärchen-Haarbecherchen
Hydnaceae	Hydnum rufescens Fr. : Fr.	Rötlicher Semmelstoppelpilz
Hydnangiaceae	Laccaria bicolor (Maire) P. D. Orton	Zweifarbiger Lacktrichterling
Hydnangiaceae	Laccaria spec.	
Hymenochaetaceae	Hymenochaete fuliginosa (Pers.) Bres.	Dunkelbrauner Borstenschleibling
Incertae sedis	Cercidospora epipolytropa (Mudd) Arnold	
Incertae sedis	Mellitiosporium propolidoides (Rehm) Rehm	
Lecanoraceae	Carbonea vitellinaria (Nyl.) Hertel	
Lycoperdaceae	Bovista nigrescens Pers. : Pers.	Schwärzender Bovist
Lycoperdaceae	Bovista plumbea Pers. : Pers.	Bleigrauer Zwergbovist
Lycoperdaceae	Lycoperdon perlatum Pers. : Pers.	Flaschen-Stäubling
Lycoperdaceae	Lycoperdon pratense Pers. : Pers.	Wiesen-Staubbecher, Wiesen-Stäubling, Münzen-
Lycoperdaceae	Lycoperdon pyriforme Schaeff. : Pers.	Birnen-Stäubling
Lycoperdaceae	Lycoperdon umbrinum Pers. : Pers.	Bräunlicher Stäubling
Marasmiaceae	Merismodes anomala (Pers. : Fr.) Singer	Rasiges Braunhaarbecherchen

Familie	Taxa (Pilze)	Deutscher Name
Marasmiaceae	Micromphale perforans (H. Hoffm. : Fr.) Gray	Nadel-Schwindling
Marasmiaceae	Rhodocollybia butyracea (Bull. : Fr.) Lennox f. asema (Fr. : Fr.) Antonín, Halling	Horngrauer Rübbling
Nidulariaceae	Crucibulum laeve (Rehhan) Kambly	Tiegelteuerling
Peniophoraceae	Peniophora aurantiaca (Bres.) Bourdot & Galzin	Grünerlen-Zystidenrindenpilz
Pluteaceae	Amanita muscaria (L. : Fr.) Lam.	Fliegenpilz
Pluteaceae	Amanita rubescens Pers. : Fr.	Perlpilz
Pluteaceae	Amanita submembranacea (Bon) Gröger	Graüätiger Scheidenstreifling
Pluteaceae	Amanita umbrinolutea (Gillet) Bataille	Zweifarbiger Scheidenstreifling
Pluteaceae	Amanita vaginata (Bull. : Fr.) Quél.	Grauer Scheidenstreifling
Polyporaceae	Laetiporus montanus Tomšovský & Jankovský	Nadelholz-Schwefelporling
Polyporaceae	Oligoporus caesius (Schrad. : Fr.) Gilb. & Ryvarden	Blauer Saftporling
Polyporaceae	Oligoporus obductus (Berk.) Gilb. & Ryvarden	Weißer Knochenporling
Polyporaceae	Phaeolus schweinitzii (Fr. : Fr.) Pat.	Kiefern-Braunporling
Polyporaceae	Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilát	Striegelige Tramete
Polyporaceae	Trametes versicolor (L. : Fr.) Pilát	Schmetterlings-Tramete
Polyporaceae	Trichaptum abietinum (Pers. : Fr.) Ryvarden	Gemeiner Violettporling
Pyrenomataceae	Cheilymenia dennisii J. Moravec	Gemeiner Mistborstling
Pyrenomataceae	Cheilymenia granulata (Bull. : Fr.) J. Moravec	Körniger Rinderdungbecherling
Pyrenomataceae	Ramsbottomia asperior (Nyl.) Benkert & T. Schumach.	
Reticulariaceae	Lycogala epidendrum (L.) Fr.	Blutmilchpilz
Rhytismataceae	Lophodermium seditiosum Minter, Staley & Millar	
Rhytismataceae	Propolis rhodoleuca (Sommerf.) Fr.	
Russulaceae	Lactarius aurantiacus Fr.	Orangefarbener Milchling
Russulaceae	Lactarius deterrimus Gröger	Fichten-Reizker
Russulaceae	Lactarius lignyotus Fr.	Mohrenkopf
Russulaceae	Lactarius mitissimus (Fr. : Fr.) Fr.	Milder Milchling
Russulaceae	Lactarius porninensis Rolland	Lärchen-Milchling
Russulaceae	Lactarius rufus (Scop. : Fr.) Fr.	Rotbrauner Milchling
Russulaceae	Lactarius scrobiculatus (Scop. : Fr.) Fr.	Grubiger Fichten-Milchling
Russulaceae	Russula albonigra (Krombh.) Fr.	Menthol-Schwärz-Täubling
Russulaceae	Russula decolorans (Fr. : Fr.) Fr.	Orangeroter Graustiel-Täubling
Russulaceae	Russula favrei M. M. Moser	Favres Täubling
Russulaceae	Russula laricina Velen.	Vielgestaltiger Täubling
Russulaceae	Russula nana Killerm.	Hochgebirgs-Spei-Täubling
Russulaceae	Russula nauseosa (Pers.) Fr.	Geriefter Weich-Täubling
Russulaceae	Russula nigricans (Bull.) Fr.	Dickblättriger Schwarz-Täubling
Russulaceae	Russula queletii Fr.	Stachelbeer-Täubling
Russulaceae	Russula spec.	
Russulaceae	Russula vesca Fr.	Speise-Täubling
Russulaceae	Russula vinosa Lindblad	Weinroter Graustiel-Täubling
Stereaceae	Stereum hirsutum (Willd. : Fr.) Gray	Striegeliger Schichtpilz
Stereaceae	Stereum sanguinolentum (Alb. & Schwein. : Fr.) Fr.	Blutender Nadelholz-Schichtpilz
Stereaceae	Stereum subtomentosum Pouzar	Samtiger Schichtpilz
Strophariaceae	Pholiota flammans (Batsch : Fr.) P. Kumm.	Feuer-Schüppling
Strophariaceae	Pholiota scamba (Fr. : Fr.) Kuyper & Tjall.-Beuk.	Seidiger Schüppling
Strophariaceae	Pholiota subochracea (A. H. Sm.) A. H. Sm. & Hesler	Schwefelkopffähnlicher Schüppling
Strophariaceae	Stropharia semiglobata (Batsch : Fr.) Quél.	Halbkugelige Träuschling
Suillaceae	Boletinus cavipes (Klotzsch : Fr.) Kalchbr.	Hohlfußröhrling
Suillaceae	Suillus bresadolae (Quél.) Gerhold	Gelbfleischiger Lärchen-Röhrling
Suillaceae	Suillus grevillei (Klotzsch : Fr.) Singer	Gold-Röhrling
Suillaceae	Suillus placidus (Bonord.) Singer	Elfenbein-Röhrling
Suillaceae	Suillus plorans (Rolland) Kuntze	Zirben-Röhrling
Suillaceae	Suillus sibiricus (Singer) Singer	Beringter Zirben-Röhrling
Suillaceae	Suillus viscidus (L.) Roussel	Grauer Lärchenröhrling
Tricholomataceae	Ampulloclitocybe clavipes (Pers. : Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys	Keulenfuß-Trichterling, Keulenfüßiger T.
Tricholomataceae	Chromosera citrinopallida (A. H. Sm. & Hesler) Vizzini & Ercole	Gelbweißer Alpen-Buntnabeling
Tricholomataceae	Clitocybe odora (Bull. : Fr.) P. Kumm. var. alba J. E. Lange	Weißer Anis-Trichterling
Tricholomataceae	Cuphophyllus pratensis (Pers.) Fr.	Orangefarbener Wiesen-Ellerling
Tricholomataceae	Cuphophyllus virgineus (Wulfen : Fr.) Kovalenko	Glasigweißer Ellerling, Schneeweißer E., Jungfern-E.
Tricholomataceae	Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod	Amiant-Körnchenschirmling
Tricholomataceae	Cystoderma fallax A. H. Sm. & Singer	Häutigberinger Körnchenschirmling
Tricholomataceae	Cystoderma jasonis (Cooke & Masee) Harmaja	Langsporiger Körnchenschirmling
Tricholomataceae	Gymnopus dryophilus (Bull. : Fr.) Murrill	Waldfreund-Rübbling
Tricholomataceae	Hygrocybe cantharellus (Schwein. : Fr.) Murrill	Pfifferlings-Saftling
Tricholomataceae	Hygrocybe coccinea (Schaeff. : Fr.) P. Kumm.	Kirschroter Saftling
Tricholomataceae	Hygrocybe conica (Schaeff. : Fr.) P. Kumm.	Kegeliger Saftling
Tricholomataceae	Hygrocybe miniata (Fr. : Fr.) P. Kumm.	Mennigroter Saftling
Tricholomataceae	Hygrocybe punicea (Fr. : Fr.) P. Kumm.	Granatroter Saftling
Tricholomataceae	Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.	Wohlriechender Schneckling
Tricholomataceae	Hygrophorus speciosus Peck	Orangegelber Lärchenschneckling
Tricholomataceae	Lepista flaccida (Sowerby : Fr.) Pat.	Fuchsiger Röteltichterling
Tricholomataceae	Lyophyllum connatum (Schumach. : Fr.) Singer	Weißer Rasling
Tricholomataceae	Melanoleuca subalpina (Britzelm.) Bresinsky & Stangl	Almen-Weichritterling
Tricholomataceae	Mycena epipterygia (Scop. : Fr.) Gray	Dehnbarer Helmring
Tricholomataceae	Mycena pura (Pers.) P. Kumm.	Rettich-Helmring
Tricholomataceae	Omphalina ericetorum (Pers. : Fr.) M. Lange	Gefalteter Nabeling

Familie	Taxa (Pilze)	Deutscher Name
Tricholomataceae	Tricholoma vaccinum (Schaeff. : Fr.) P. Kumm.	Wolliger Ritterling
Tricholomataceae	Tricholomopsis decora (Fr. : Fr.) Singer	Olivgelber Holzritterling

Flechten

Roman Türk

Nachgewiesene Taxa: 139 (145) – siehe Tab. 1

Dokumentierte Einzelnachweise: 226

Expert/-innen: Merle Geissberger, Jürgen Grieshofer, Claudia Laimer, Johannes Schlagbauer, Roman Türk, Helmut Wittmann

Im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 wurden Flechten in folgenden Untersuchungsgebieten erhoben: Umgebung der Patscher Alm, der Oberhausalm und der Jagdhausalmen. Zusätzlich wurden auch Flechten im Umfeld von St. Jakob und bei Ranach nachgewiesen.

Ein besonderer Nachweis stellte der Fund von *Epiphloea byssina* in der Umgebung der Patscher Alm dar: Bei dieser Flechte handelt es sich um eine äußerst selten gefundene Art.

Weitere Bemerkenswerte, beobachtete Arten waren *Polycauliona candelaria* und *Letharia vulpina* (Abb. 10 & 11).

Abbildung 10: *Polycauliona candelaria* (Foto: Roman Türk).

Abbildung 11: *Letharia vulpina* (Foto: Roman Türk).

Tabelle 3: Nachweise von Flechten, die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Flechten)	Deutscher Name
Acarosporaceae	<i>Acarospora fuscata</i> (Schrad.) Th. Fr.	
Acarosporaceae	<i>Acarospora sinopica</i> (Wahlenb.) Körb.	
Agyriaceae	<i>Schaereria fuscocinerea</i> (Nyl.) Clauzade & Cl. Roux	
Agyriaceae	<i>Trapeliopsis granulosa</i> (Hoffm.) Lumbsch	
Agyriaceae	<i>Xylographa parallela</i> (Ach.: Fr.) Behlen & Desberger	
Agyriaceae	<i>Xylographa vitiligo</i> (Ach.) J.R. Laundon	
Bacidiaceae	<i>Tephromela atra</i> (Huds.) Hafellner var. <i>atra</i>	
Chrysothricaceae	<i>Chrysothrix chlorina</i> (Ach.) J. R. Laundon	
Cladoniaceae	<i>Cladonia amaurocraea</i> (Flörke) Schaer.	
Cladoniaceae	<i>Cladonia cenotea</i> (Ach.) Schaer.	
Cladoniaceae	<i>Cladonia cervicornis</i> (Ach.) Flot. ssp. <i>verticillata</i> (Hoffm.) Ahti	
Cladoniaceae	<i>Cladonia chlorophaea</i> (Flörke ex Sommerf.) Spreng.	
Cladoniaceae	<i>Cladonia coccifera</i> (L.) Willd.	
Cladoniaceae	<i>Cladonia coniocraea</i> (Flörke) Spreng.	
Cladoniaceae	<i>Cladonia crispata</i> (Ach.) Flot.	
Cladoniaceae	<i>Cladonia digitata</i> (L.) Hoffm.	
Cladoniaceae	<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr.	
Cladoniaceae	<i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrad. ssp. <i>furcata</i>	
Cladoniaceae	<i>Cladonia macilenta</i> Hoffm. ssp. <i>macilenta</i>	
Cladoniaceae	<i>Cladonia macroceras</i> (Delise) Hav.	
Cladoniaceae	<i>Cladonia mitis</i> Sandst.	
Cladoniaceae	<i>Cladonia phyllophora</i> Hoffm.	
Cladoniaceae	<i>Cladonia pleurota</i> (Flörke) Schaer.	
Cladoniaceae	<i>Cladonia polydactyla</i> (Flörke) Spreng.	
Cladoniaceae	<i>Cladonia pyxidata</i> (L.) Hoffm.	
Cladoniaceae	<i>Cladonia rangiferina</i> (L.) F.H. Wigg.	
Cladoniaceae	<i>Cladonia squamosa</i> Hoffm. var. <i>squamosa</i>	
Cladoniaceae	<i>Cladonia stygia</i> (Fr.) Ruoss	
Cladoniaceae	<i>Cladonia sulphurina</i> (Michx.) Fr.	
Cladoniaceae	<i>Cladonia uncialis</i> (L.) F.H. Wigg.	
Cladoniaceae	<i>Cladonia uncialis</i> (L.) F.H. Wigg. subsp. <i>uncialis</i>	
Hymeneliaceae	<i>Aspicilia cinerea</i> (L.) Körb.	
Hymeneliaceae	<i>Tremolecia atrata</i> (Ach.) Hertel	
Icmadophilaceae	<i>Icmadophila ericetorum</i> (L.) Zahlbr.	
Lecanoraceae	<i>Lecanora cenisia</i> Ach. var. <i>cenisia</i>	
Lecanoraceae	<i>Lecanora epibryon</i> (Ach.) Ach.	
Lecanoraceae	<i>Lecanora intricata</i> (Ach.) Ach.	
Lecanoraceae	<i>Lecanora polytropa</i> (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh. var. <i>polytropa</i>	
Lecanoraceae	<i>Lecanora pulicaris</i> (Pers.) Ach.	
Lecanoraceae	<i>Lecanora rupicola</i> (L.) Zahlbr. subsp. <i>rupicola</i> var. <i>rupicola</i>	
Lecanoraceae	<i>Lecanora symmicta</i> (Ach.) Ach.	
Lecanoraceae	<i>Lecanora varia</i> (Hoffm.) Ach.	
Lecanoraceae	<i>Lecidella wulfenii</i> (Hepp) Körb.	
Lecanoraceae	<i>Protoparmeliopsis muralis</i> (Schreb.) M. Choisy	
Lecanoraceae	<i>Ramboldia insidiosa</i> (Th. Fr.) Hafellner	
Lecanoraceae	<i>Rhizoplaca melanophthalma</i> (DC.) Leuckert & Poelt	
Lecideaceae	<i>Lecidea confluens</i> (Weber) Ach. var. <i>confluens</i>	
Lecideaceae	<i>Lecidea lapicida</i> (Ach.) Ach. var. <i>lapicida</i>	
Lecideaceae	<i>Lecidea silacea</i> (Ach.) Ach.	
Micareaeae	<i>Micarea lignaria</i> (Ach.) Hedl. var. <i>lignaria</i>	
Micareaeae	<i>Psilolechia lucida</i> (Ach.) M. Choisy	
Ophioparmaceae	<i>Ophioparma ventosa</i> (L.) Norman var. <i>ventosa</i>	
Pannariaceae	<i>Protopannaria pezizoides</i> (Weber) M. Jørg. & S. Ekman	
Parmeliaceae	<i>Alectoria ochroleuca</i> (Hoffm.) A. Massal.	
Parmeliaceae	<i>Alloctetaria madreporiformis</i> (Ach.) Kärnefelt & A. Thell	
Parmeliaceae	<i>Brodoa intestiniformis</i> (Vill.) Goward	
Parmeliaceae	<i>Bryoria capillaris</i> (Ach.) Brodo & D. Hawksw.	
Parmeliaceae	<i>Bryoria fuscescens</i> (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw.	
Parmeliaceae	<i>Bryoria nadvornikiana</i> (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw.	
Parmeliaceae	<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.	
Parmeliaceae	<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach. subsp. <i>islandica</i>	
Parmeliaceae	<i>Cetraria muricata</i> (Ach.) Eckfeldt	
Parmeliaceae	<i>Cornicularia normoerica</i> (Gunnerus) Du Rietz	
Parmeliaceae	<i>Evernia mesomorpha</i> Nyl.	
Parmeliaceae	<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach.	
Parmeliaceae	<i>Flavocetraria cucullata</i> (Bellardi) Kärnefelt & A. Thell	
Parmeliaceae	<i>Flavocetraria nivalis</i> (L.) Kärnefelt	
Parmeliaceae	<i>Hypogymnia bitteri</i> (Lynge) Ahti	
Parmeliaceae	<i>Hypogymnia farinacea</i> Zopf	
Parmeliaceae	<i>Hypogymnia physodes</i> (L.) Nyl.	
Parmeliaceae	<i>Hypogymnia tubulosa</i> (Schaer.) Hav.	
Parmeliaceae	<i>Letharia vulpina</i> (L.) Hue	
Parmeliaceae	<i>Melanella hepaticum</i> (Ach.) Thell	

Familie	Taxa (Flechten)	Deutscher Name
Parmeliaceae	Melanelia panniformis (Nyl.) Essl.	
Parmeliaceae	Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al.	
Parmeliaceae	Parmelia saxatilis (L.) Ach.	
Parmeliaceae	Parmelia sulcata Taylor	
Parmeliaceae	Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.	
Parmeliaceae	Protoparmelia badia (Hoffm.) Hafellner	
Parmeliaceae	Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf	
Parmeliaceae	Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf var. furfuracea	
Parmeliaceae	Usnea florida (L.) F. H. Wigg.	
Parmeliaceae	Usnea scabrata Nyl. var. scabrata	
Parmeliaceae	Usnea subfloridana Stirt.	
Parmeliaceae	Vulpicida pinastris (Scop.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai	
Parmeliaceae	Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale	
Peltigeraceae	Peltigera aphthosa (L.) Willd.	
Peltigeraceae	Peltigera canina (L.) Willd.	
Peltigeraceae	Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.	
Peltigeraceae	Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln.	
Peltigeraceae	Peltigera malacea (Ach.) Funck	
Peltigeraceae	Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm.	
Peltigeraceae	Peltigera rufescens (Weiss) Humb.	
Peltigeraceae	Peltigera venosa (L.) Hoffm.	
Peltigeraceae	Solorina bispora Nyl.	
Peltigeraceae	Solorina crocea (L.) Ach.	
Pertusariaceae	Ochrolechia szatalaensis Verseghy	
Pertusariaceae	Pertusaria corallina (L.) Arnold	
Pertusariaceae	Pertusaria lactea (L.) Arnold	
Physciaceae	Dimelaena oreina (Ach.) Norman	
Physciaceae	Physcia dubia (Hoffm.) Lettau	
Physciaceae	Physconia muscigena (Ach.) Poelt	
Physciaceae	Rinodina milvina (Wahlenb.) Th. Fr.	
Porpidiaceae	Bellemeria alpina (Sommerf.) Clauzade & Cl. Roux	
Porpidiaceae	Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph	
Psoraceae	Lecidoma demissum (Rutstr.) Gotth. Schneid. & Hertel	
Ramalinaceae	Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.	
Rhizocarpaceae	Rhizocarpon geographicum (L.) DC.	
Rhizocarpaceae	Rhizocarpon geographicum (L.) DC. ssp. geographicum	
Rhizocarpaceae	Rhizocarpon ridescens (Nyl.) Zahlbr.	
Stereocaulaceae	Stereocaulon alpinum Laurer	
Stereocaulaceae	Stereocaulon dactylophyllum Flörke	
Teloschistaceae	Caloplaca ammiospila (Wahlenb. ex Ach.) H. Olivier	
Teloschistaceae	Caloplaca saxifragarum Poelt	
Teloschistaceae	Caloplaca stillicidiorum (Vahl) Lynge	
Teloschistaceae	Xanthoria elegans (Link) Th. Fr.	
Thelotremataceae	Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman	
Umbilicariaceae	Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey	
Umbilicariaceae	Umbilicaria cylindrica (L.) Delise ex Duby var. cylindrica	
Umbilicariaceae	Umbilicaria deusta (L.) Baumg.	
Umbilicariaceae	Umbilicaria hirsuta (Sw. ex Westr.) Hoffm.	
Umbilicariaceae	Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg.	
Incertae sedis	Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.	
Incertae sedis	Chrysothrix chlorina (Ach.) J.R. Laundon	
Incertae sedis	Dibaeis baeomyces (L. fil.) Rambold & Hertel	
Incertae sedis	Epiphloea byssina (Hoffm.) Henssen & P.M. Jørg	
Incertae sedis	Flavocetraria nivalis (L.) Kärnefelt & A. Thell	
Incertae sedis	Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy	
Incertae sedis	Imshaugia aleurites (Ach.) S.L.F. Meyer	
Incertae sedis	Lecanora polytropa (Hoffm.) Rabenh.	
Incertae sedis	Myriolecis dispersa (Pers.) Sliwa, Zhao Xin & Lumbsch	
Incertae sedis	Myriolecis hagenii (Ach.) Sliwa, Zhao Xin & Lumbsch	
Incertae sedis	Ochrolechia alboflavescens (Wulf.) Zahlbr.	
Incertae sedis	Peltigera didactyla (With.) J.R. Laundon var. didactyla	
Incertae sedis	Polycauliona candelaria (L.) Frödén, Arup & Søchting	
Incertae sedis	Sarea difformis (Fr.) Fr.	
Incertae sedis	Solorina bispora Nyl. subsp. bispora	
Incertae sedis	Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer.	
Incertae sedis	Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. var. vermicularis	
Incertae sedis	Toensbergia leucococca (R. Sant.) Bendiksy & Tindal	
Incertae sedis	Umbilicaria cylindrica (L.) Delise	
Incertae sedis	Umbilicaria vellea (L.) Ach.	
Incertae sedis	Usnea dasopoga (Ach.) Nyl.	
Incertae sedis	Vulpicida juniperinus (L.) J.-E. Mattsson & M.J. Lai	
Incertae sedis	Xanthomendoza fulva (Hoffm.) Søchting, Kärnefelt & S.Y. Kondr.	

Moose

Patrick Gros

Nachgewiesene Taxa: 205

Dokumentierte Einzelnachweise: 259

Expert/-innen: Wolfgang Hofbauer, Martin Kurzthaler, Detlef Tolke & Wilfried Franz

Im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 wurden Moose in folgenden Untersuchungsgebieten erhoben: Oberhausalm, Jagdhausalmen, Schwarzachtal, Patscher Alm, Patscher Tal und Arvental.

Insgesamt wurden 259 Nachweise von 205 Arten dokumentiert.

Besonders bemerkenswert war die Entdeckung von *Schistidium platyphyllum*: Es handelt sich um den ersten gesicherten Fund dieser Art für Osttirol (ELLIS et al. 2019)! Wolfgang Hofbauer und Martin Kurzthaler wiesen diese Moosart im Bereich des Weges zwischen Oberhaus und Jagdhaus in ca. 1770 m Höhe nach. Sie beobachteten Polster dieser Moosart, die knapp über die Oberfläche des Schwarzachbachs auf Silikatgesteinen wuchsen.

Abbildung 12: *Schistidium platyphyllum* im Oberen Defereggental - erster gesicherter Fund für Osttirol! (Foto: Wolfgang Hofbauer).

Tabelle 4: Nachweise von Moosen, die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Moose)	Deutscher Name
Adelanthaceae	<i>Odontoschisma elongatum</i> (Lindb.) Evans	
Amblystegiaceae	<i>Amblystegium serpens</i> (Hedw.) Schimp.	
Amblystegiaceae	<i>Campylium chrysophyllum</i> (Brid.) J. Lange	
Amblystegiaceae	<i>Campylium stellatum</i> (Hedw.) J. Lange & C. Jens. ssp. <i>protensum</i>	
Amblystegiaceae	<i>Cratoneuron filicinum</i> (Hedw.) Spruce	
Amblystegiaceae	<i>Drepanocladus revolvens</i> (Sm.) Warnst.	
Amblystegiaceae	<i>Hygrohypnum duriusculum</i> (De Not.) Jamieson	
Amblystegiaceae	<i>Hygrohypnum luridum</i> (Hedw.) Jenn.	
Amblystegiaceae	<i>Palustriella commutata</i> (Hedw.) Ochyra	

Familie	Taxa (Moose)	Deutscher Name
Amblystegiaceae	Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske	
Andreaeaceae	Andreaea rupestris Hedw.	
Aneuraceae	Aneura pinguis (L.) Dumort.	
Aneuraceae	Riccardia palmata (Hedw.) Carruth.	
Antheliaceae	Anthelia juratzkana	Schneeboden-Lebermoos
Aulacomniaceae	Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr.	
Bartramiaceae	Bartramia halleriana Hedw.	
Bartramiaceae	Bartramia ithyphylla Brid.	
Bartramiaceae	Philonotis fontana (Hedw.) Brid.	
Bartramiaceae	Philonotis seriata Mitt.	
Bartramiaceae	Plagiopus oederianus (Sw.) H. A. Crum & L. E. Anderson	
Blasiaceae	Blasia pusilla L.	
Brachytheciaceae	Brachythecium glareosum (Spruce) Schimp.	
Brachytheciaceae	Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp.	
Brachytheciaceae	Brachythecium reflexum (Starke) Schimp.	
Brachytheciaceae	Brachythecium rivulare Schimp.	
Brachytheciaceae	Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.	
Brachytheciaceae	Brachythecium salebrosum (Web. & Mohr) Schimp.	
Brachytheciaceae	Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp.	
Brachytheciaceae	Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout	
Brachytheciaceae	Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn.	
Brachytheciaceae	Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp.	
Bryaceae	Bryum argenteum Hedw.	
Bryaceae	Bryum capillare Hedw.	
Bryaceae	Bryum pallens Sw.	
Bryaceae	Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn., Meyer & Scherb.	
Bryaceae	Bryum schleicheri DC.	
Bryaceae	Bryum subelegans Kindb.	
Calliergonaceae	Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb.	
Calliergonaceae	Calliergon sarmentosum (Wahlenb.) Kindb.	
Calliergonaceae	Calliergon stramineum (Brid.) Kindb.	
Calliergonaceae	Warnstorfia exannulata (Schimp. in B. S. G.) Loeske	
Calliergonaceae	Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske	
Calyptogeiaceae	Calyptogea fissa (L.) Raddi	
Cephaloziaceae	Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort.	
Cephaloziellaceae	Cephaloziella rubella (Nees) Warnst.	
Cinclidiaceae	Rhizomnium pseudopunctatum (B. & S.) T. Kop.	
Cinclidiaceae	Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. Kop.	
Climaciaceae	Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr	
Conocephalaceae	Conocephalum conicum (L.) Underw.	
Dicranaceae	Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp.	
Dicranaceae	Dicranella grevilleana (Brid.) Schimp.	
Dicranaceae	Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.	
Dicranaceae	Dicranella subulata (Hedw.) Schimp.	
Dicranaceae	Dicranum bonjeanii De Not.	
Dicranaceae	Dicranum montanum Hedw.	
Dicranaceae	Dicranum polysetum Sw.	
Dicranaceae	Dicranum scoparium Hedw.	
Dicranaceae	Paraleucobryum enerve (Thed.) Loeske	
Dicranaceae	Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske	
Ditrichaceae	Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.	
Ditrichaceae	Distichium capillaceum (Hedw.) B., S. & G.	
Ditrichaceae	Ditrichum flexicaule (Schwaegr.) Hampe	
Encalyptaceae	Encalypta ciliata Hedw.	
Encalyptaceae	Encalypta rhamnoides (Hedw.) Schwaegr.	
Encalyptaceae	Encalypta streptocarpa Hedw.	
Entodontaceae	Entodon concinnus (De Not.) Par.	
Fissidentaceae	Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb.	
Funariaceae	Funaria hygrometrica Hedw.	
Geocalyceae	Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort.	
Grimmiaceae	Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce	
Grimmiaceae	Grimmia affinis Hornsch.	
Grimmiaceae	Grimmia anodon B., S. & G.	
Grimmiaceae	Grimmia donniana var. triformis	
Grimmiaceae	Grimmia elatior Bals. & De Not.	
Grimmiaceae	Racomitrium affine	
Grimmiaceae	Racomitrium elongatum Frisv.	
Grimmiaceae	Racomitrium ericoides (Brid.) Brid.	
Grimmiaceae	Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid.	
Grimmiaceae	Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.	
Grimmiaceae	Schistidium apocarpum (Hedw.) B., S. & G.	
Grimmiaceae	Schistidium atrofussum (Schimp.) Limpr. ss. lato	
Grimmiaceae	Schistidium dupretii (Ther.) W. A. Web.	
Grimmiaceae	Schistidium papillosum	
Grimmiaceae	Schistidium pratense nom. prov.	
Grimmiaceae	Schistidium rivulare (Brid.) Podp.	

Familie	Taxa (Moose)	Deutscher Name
Grimmiaceae	Schistidium platyphyllum (Mitt.) H.Perss.	
Grimmiaceae	Schistidium trichodon (Brid.) Poelt	
Gymnomitriaceae	Gymnomitrium concinnatum (Lightf.) Corda	
Gymnomitriaceae	Gymnomitrium coralloides Nees	
Hedwigiaceae	Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv.	
Hylocomiaceae	Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) M.Fleisch	
Hylocomiaceae	Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.	
Hylocomiaceae	Pleurozium schreberi (Hedw.) Mitt.	
Hylocomiaceae	Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.	
Hylocomiaceae	Rhytidiadelphus subpinnatus	
Hylocomiaceae	Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.	
Hypnaceae	Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske	
Hypnaceae	Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.	
Hypnaceae	Hypnum cupressiforme Hedw.	
Hypnaceae	Hypnum lindbergii Mitt.	
Hypnaceae	Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb.	
Hypnaceae	Hypnum vaucheri Lesq.	
Hypnaceae	Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.	
Jungermanniaceae	Anastrophyllum minutum (Schreb.) Schust.	
Jungermanniaceae	Barbilophozia barbata (Schreb.) Loeske	
Jungermanniaceae	Barbilophozia hatcheri (Evans) Loeske	
Jungermanniaceae	Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske	
Jungermanniaceae	Jungermannia obovata Nees	
Lembophyllaceae	Isothecium alopecuroides (Dubois) Isov.	
Lepidoziaceae	Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Lindb.	
Lepidoziaceae	Lepidozia reptans (L.) Dumort.	
Leskeaceae	Lescurea saxicola (Schimp.) Milde	
Leskeaceae	Pseudoleskea incurvata (Hedw.) Loeske	
Leskeaceae	Pseudoleskea radicata (Mitt.) Mac. & Kindb.	
Leskeaceae	Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyh.	
Leskeaceae	Ptychodium plicatum (Web. & Mohr) Schimp.	
Leucobryaceae	Dicranodontium denudatum (Brid.) Britt.	
Lophoziaceae	Lophozia ascendens (Warnst.) Schust.	
Lophoziaceae	Lophozia incisa (Schrad.) Dumort.	
Lophoziaceae	Lophozia longiflora (Nees) Schiffn.	
Lophoziaceae	Lophozia sudetica (Hüb.) Grolle	
Lophoziaceae	Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort.	
Lophoziaceae	Tritomaria quinquentata (Huds.) Buch	
Lophoziaceae	Tritomaria scitula (Tayl.) Jørg.	
Marchantiaceae	Marchantia polymorpha L.	
Marchantiaceae	Preissia quadrata (Scop.) Nees	
Meesiaceae	Amblyodon dealbatus (Hedw.) P. Beauv.	
Meesiaceae	Meesia uliginosa Hedw.	
Mielichhoferiaceae	Pohlia cruda (Hedw.) Lindb.	
Mielichhoferiaceae	Pohlia drummondii (C. Müll.) Andr.	
Mielichhoferiaceae	Pohlia elongata Hedw.	
Mielichhoferiaceae	Pohlia ludwigii (Schwaegr.) Broth.	
Mielichhoferiaceae	Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.	
Mielichhoferiaceae	Pohlia prolifera (Breidl.) H. Arnell	
Mniaceae	Mnium stellare Hedw.	
Mniaceae	Mnium thomsonii Schimp.	
Muscicapidae	Cinclidium stygium Sw.	
Orthotrichaceae	Orthotrichum affine Brid.	
Orthotrichaceae	Orthotrichum anomalum Hedw.	
Orthotrichaceae	Orthotrichum rupestre Schwaegr.	
Orthotrichaceae	Orthotrichum striatum Hedw.	
Pelliaceae	Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort.	
Plagiochilaceae	Plagiochila porelloides (Nees) Lindenb.	
Plagiomniaceae	Plagiomnium affine (Bland.) T. Kop.	
Plagiomniaceae	Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop.	
Plagiomniaceae	Plagiomnium ellipticum (Brid.) T. Kop.	
Plagiotheciaceae	Isopterygiopsis pulchella (Hedw.) Z. Iwats.	
Plagiotheciaceae	Myurella julacea (Schwaegr.) Schimp.	
Plagiotheciaceae	Orthothecium intricatum (Hartm.) Schimp.	
Plagiotheciaceae	Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp.	
Plagiotheciaceae	Plagiothecium laetum Schimp.	
Polytrichaceae	Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv.	
Polytrichaceae	Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC.	
Polytrichaceae	Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv.	
Polytrichaceae	Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G. Sm.	
Polytrichaceae	Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm.	
Polytrichaceae	Polytrichum juniperinum Hedw.	
Polytrichaceae	Polytrichum piliferum Hedw.	
Polytrichaceae	Polytrichum strictum Brid.	
Pottiaceae	Barbula crocea (Brid.) Web. & Mohr	
Pottiaceae	Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) Chen	

Familie	Taxa (Moose)	Deutscher Name
Pottiaceae	Desmatodon latifolius (Hedw.) Brid.	
Pottiaceae	Desmatodon leucostomus (R. Br.) Berggr.	
Pottiaceae	Hymenostylium recurvirostre (Hedw.) Dixon	
Pottiaceae	Syntrichia norvegica F. Weber	
Pottiaceae	Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr	
Pottiaceae	Tortella fragilis (Hook. & Wils.) Limpr.	
Pottiaceae	Tortella inclinata (Hedw. f.) Limpr.	
Pottiaceae	Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.	
Pottiaceae	Weissia controversa Hedw.	
Pseudolepico-	Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort.	
Pterigynandraceae	Heterocladium dimorphum (Brid.) Schimp.	
Pterigynandraceae	Pterigynandrum filiforme Hedw.	
Ptilidiaceae	Ptilidium pulcherrimum (G. Web.) Vainio	
Radulaceae	Radula complanata (L.) Dumort.	
Rhabdoweisiaceae	Amphidium mougeotii (B. & S.) Schimp.	
Rhabdoweisiaceae	Cynodontium polycarpon (Hedw.) Schimp.	
Rhabdoweisiaceae	Dichodontium palustre (Dicks.) M. Stech	
Rhabdoweisiaceae	Dicranoweisia crispula (Hedw.) Milde	
Rhabdoweisiaceae	Rhabdoweisia fugax (Hedw.) B., S. & G.	
Rhytidiaceae	Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb.	
Scapaniaceae	Diplophyllum albicans (L.) Dumort.	
Scapaniaceae	Diplophyllum obtusifolium (Hook.) Dumort.	
Scapaniaceae	Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dumort.	
Scapaniaceae	Scapania curta (Mart.) Dumort.	
Scapaniaceae	Scapania cuspiduligera (Nees) K. Müll.	
Scapaniaceae	Scapania mucronata Buch	
Scapaniaceae	Scapania subalpina (Lindenb.) Dumort.	
Scapaniaceae	Scapania uliginosa (Lindenb.) Dumort.	
Scapaniaceae	Scapania undulata (L.) Dumort.	
Seligeriaceae	Blindia acuta (Hedw.) B., S. & G.	
Sphagnaceae	Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.	
Sphagnaceae	Sphagnum centrale C. Jens.	
Sphagnaceae	Sphagnum girgensohnii Russ.	
Sphagnaceae	Sphagnum palustre L.	
Sphagnaceae	Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr.	
Sphagnaceae	Sphagnum warnstorffii Russ.	
Splachnaceae	Splachnum sphaericum Hedw.	
Splachnaceae	Tetraplodon mnioides (Hedw.) B., S. & G.	
Tetraphidaceae	Tetraphis pellucida Hedw.	
Thuidiaceae	Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch.	
Thuidiaceae	Thuidium philibertii Limpr.	
Timmiaceae	Timmia bavarica Hessel.	
Incertae sedis	Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph.	
Incertae sedis	Mannia fragrans (Balb.) Frye & Clark	

Jochalgen

Patrick Gros

Nachgewiesene Taxa: 23

Dokumentierte Einzelnachweise: 31

Expert/-innen: Anke Oertel

In der Umgebung der Jagdhausalmen und im Arvental wurden Gewässer, Quellfluren und Niedermoore auf ihre Algenflora untersucht.

Insgesamt wurden 31 Nachweise von 23 Arten dokumentiert.

Abbildung 13: *Spirotaenia condensata*, eine besonders schöne Vertreterin der Jochalgen wurde im Arvental nachgewiesen (Foto: Anke Oertel).

Tabelle 5: Nachweise von Jochalgen, die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Jochalgen)	Deutscher Name
Desmidiaceae	<i>Closterium ehrenbergii</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Closterium parvulum</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Closterium striolatum</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Cosmarium conspersum</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Cosmarium dentiferum</i> var. <i>alpinum</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Cosmarium holmiense</i> var. <i>integrum</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Cosmarium hornavanense</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Cosmarium pachydermum</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Cosmarium portianum</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Cosmarium ralfsii</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Cosmarium subochthodes</i> Schmidle	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Cosmarium tetraophthalmum</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Euastrum oblongum</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Micrasterias crux-melitensis</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Netrium digitus</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Pleurotaenium ehrenbergii</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Pleurotaenium</i> spec.	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Spirotaenia condensata</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Staurastrum hirsutum</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Staurastrum orbiculare</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Staurastrum punctulatum</i>	Desmidiaceae
Desmidiaceae	<i>Tetmemorus granulatus</i>	Desmidiaceae
Zygnemataceae	<i>Spirogyra</i> spec.	Zygnemataceae

Blütenpflanzen und Farne

Helmut Wittmann

Nachgewiesene Taxa: 479 (547) – siehe Tab. 1

Dokumentierte Einzelnachweise: 2.682

Expert/-innen: Brunner Evelyn, Fischer Manfred, Franz Wilfried, Gewolf Susanne, Meindl Hedwig, Nowotny Günther, Oertl Anke, Stöhr Oliver, Stross Franz, Tritthart Gertrud, Wittmann Helmut, Wittwer Susanne

Auch der Tag der Artenvielfalt 2017 im Schwarzachtal in Osttirol war aus Sicht der Farn- und Blütenpflanzen sehr artenreich. Er konnte zwar nicht ganz an die Artenfülle des Tages der Artenvielfalt 2016 (vgl. WITTMANN 2018) heranreichen, er zählt jedoch unzweifelhaft zu den artenreichsten Tagen der Artenvielfalt im Nationalpark Hohe Tauern. Insgesamt wurden 547 Taxa an Farn- und Blütenpflanzen festgestellt, wobei vom Autor selbst 433 Arten nachgewiesen werden konnten. Auch die Anzahl der notierten Datensätze mit 2.682 ist beachtlich, wobei insgesamt 1.924 Datensätze auf den Autor zurückgehen. Die erfassten Bereiche liegen schwerpunktmäßig im oberen Schwarzachtal und zwar ausgehend von der Oberhausalm zur Jagdhausalm und nördlich bzw. nordwestlich der Jagdhausalm im Bereich des Talschlusses der beiden Fließgewässer Schwarzach und Arve. Auch das westliche Arvental in Richtung italienische Grenze wurde erfasst, genauso wie das Hörnle nördlich der Jagdhausalm und die Höhenrücken nördlich anschließend an diesem Gipfel. Einzelne Nachweise stammen auch aus dem äußeren Teil der Schwarzach im weiteren Umfeld von St. Jakob im Deferegggen und vom Stallersattel.

Im Nachfolgenden soll auf einige bemerkenswerte Nachweise eingegangen werden.

***Botrychium simplex* (Einfache Mondraute)**

Botrychium simplex ist eine Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie und zählt im Alpenraum sicherlich zu den außerordentlichen Raritäten. Detaillierte Angaben über die Verbreitung von *B. simplex* und die wenigen bisher aus Österreich vorliegenden Nachweise sind bei ARMING et al. (2016) zusammengestellt. In Osttirol sind vergleichsweise viele Nachweise bekannt geworden, wobei jedoch der Großteil aus dem 19. Jahrhundert stammt. Diesbezüglich wären die Bergeralm bei Virgen, der Fuß des Zunig bei Matrei, die Dorferalm bei Prägarten und – relativ aktuell – das hintere Defereggental zu nennen (NATURKUNDLICHE ARBEITSGEMEINSCHAFT Osttirol, 2012). Der nunmehr im Zuge des Tages der Artenvielfalt erbrachte Nachweis am Stallersattel (Manfred Fischer) ist daher auch auf nationaler und sogar internationaler Ebene als äußerst bemerkenswerter Nachweis zu nennen.

***Carduus defloratus* ssp. *tridentinus* (Trientiner Berg-Ringdistel)**

Auf diese bisher in den österreichischen und Tiroler Floren (FISCHER et al. 2008; POLATSCHKE 1997) kaum beachtete oder verkannte Art wird bei STÖHR et al. (2007) näher eingegangen. Die Art unterscheidet sich von der nahe verwandten Subspezies *viridis* durch die wesentlich stärker bedorneten und deutlich fiederspaltigen Blätter. Auch sind die Abschnitte der Laubblätter gelappt und am Rand kraus. Alleine anhand der stärkeren Bedornung und des „unangenehmen“ Herbarisierens dieser Unterart ist die Sippe relativ gut kenntlich. Die ebenfalls nahe verwandte Subspezies *summanus* (Syn. *C. defloratus* ssp. *crassifolius*) unterscheidet sich durch die kahlen, fast nicht geteilten, meist stark glauken, fleischigen und beim Umbiegen am Mittelnerv „knackig“ abbrechenden unteren Stängelblätter.

STÖHR et al. (2007) wiesen bereits darauf hin, dass die Subspezies *tridentinus* in durchwegs typischen Formen im Defereggental und anderen Bereichen Osttirols nicht selten auftritt. Die Autoren geben Almrasen, Wegränder oder auch gefestigte Lawinarschuttrassen als Lebensraum für diese Unterart an.

Bemerkenswerterweise konnte am Tag der Artenvielfalt im hinteren Deferegggen- bzw. Schwarzachtal ausschließlich diese Unterart festgestellt werden, die in weiten Bereichen Österreichs sonst häufige Subspezies *viridis* wurde nicht aufgefunden bzw. zumindest nicht kartiert. Da das Untergrundgestein im oberen Schwarzachtal durchaus sehr heterogen ist – es liegt kalkhaltiges und saures Gestein vor – deutet diese Beobachtung auf eine gewisse arealmäßi-

ge Differenzierung der Unterarten von *C. defloratus* hin. Ergänzend sei erwähnt, dass im Band 6 der Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg (POLATSCHKEK & NEUNER 2013a) offensichtlich eine völlig andere Gliederung und taxonomisch-nomenklatorische Behandlung der Artengruppe um *C. defloratus* vorgenommen wird. Diese weicht deutlich von der sonst üblichen Bearbeitung des Verwandtschaftskreises ab, ist nicht mit den Schlüsselmerkmalen in der aktuellen Österreich-Flora (FISCHER et al. 2008) in Einklang zu bringen und ist auch für uns – zumindest derzeit – nicht nachvollziehbar.

***Carex bicolor* (Zweifarbigen-Segge)**

Die außerordentlich schönen Vorkommen von *Carex bicolor* (Abb. 14) im oberen Teil der Schwarzach und im Arvental sind durch die Untersuchungen von WITTMANN et al. (2007b) bereits bekannt und detailliert dargestellt worden. Die mehrfachen Nachweise am Tag der Artenvielfalt bestätigen, dass die Schwemmländer in diesem Bereich noch außerordentlich gut intakt sind und in derselben Qualität vorliegen wie bei der Moor- und Schwemmlanduntersuchung im Nationalpark Hohe Tauern, die nunmehr schon über zehn Jahre zurückliegt.

Abbildung 14: Die Zweifarben Segge, eine typische Art alpiner Schwemmlandbiotope, besitzt naturschutzfachlich äußerst wertvolle Populationen im Schwarzach- und Arvental (Foto: Helmut Wittmann).

***Carex dioica* (Zweihäusigen-Segge)**

Von *Carex dioica* (Abb. 15) sind in der Flora von POLATSCHKEK (2001) nur 6 aktuelle Fundorte in Osttirol eingetragen. Weitere Nachweise aus Osttirol veröffentlichte STÖHR (2011). Die Art konnte im Arvental bereits im Rahmen der Moorkartierung (WITTMANN et al. 2007a) nachgewiesen werden, am Tag der Artenvielfalt wurde diese generell nicht häufige Seggen-Art erneut aufgefunden und zwar nicht nur im Arvental, sondern auch im Tal der Schwarzach. Die Vorkommen können als Indikator für die gute Erhaltung der Feuchtlebensräume im Untersuchungsgebiet gewertet werden.

Abbildung 15: Die seltene Zweihäusig-Segge tritt mehrfach im Arven- und Schwarzachtal auf (Foto: Helmut Wittmann).

***Carex ericetorum* (Heide-Segge)**

Auch von *Carex ericetorum* (Abb. 16) sind in der Tirol-Flora von Polatschek (2001) nur 6 aktuelle Funde eingetragen. Über weitere Nachweise dieser sicherlich oft verkannten bzw. unbeachteten Segge aus Osttirol wird bei Stöhr et al. (2007) und Stöhr (2008) berichtet. Auch im Zuge des „Tages der Artenvielfalt im Nationalpark Hohe Tauern“ wurde diese vertikal weit verbreitete Art im unteren Kalser Dorfertal entdeckt (vgl. Stöhr & Dämon 2007). Der aktuelle Nachweis von Oliver Stöhr im hinteren Schwarzachtal ist daher bemerkenswert.

***Carex mucronata* (Stachelspitz-Segge)**

Von dieser Seggen-Art finden sich in der Tirol-Flora von Polatschek (2001) ausschließlich aktuelle Nachweise aus dem südlichen Osttirol, d. h. aus dem Bereich der südlichen Kalkalpen (Karawanken). Im Nachtragsband 7 der Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg (Polatschek & Neuner, 2013b) werden erstmals Funde der Stachelspitz-Segge aus dem Schwarzachtal aufgelistet. Der nunmehrige Nachweis von Wilfried Franz im hinteren Schwarzachtal bestätigt diese, von den südlichen Kalkalpen in hohem Maße separierten Vorkommen. Das Auftreten von sehr kalkreichen Gesteinen insbesondere im Bereich östlich der Jagdhausalmen macht ein Vorkommen dieser kalkliebenden Art im Untersuchungsgebiet möglich.

***Cerastium arvense* ssp. *suffruticosum* (Verholzendes Acker-Hornkraut)**

Über *Cerastium arvense* ssp. *suffruticosum* wird bei Stöhr et al. (2006) ausführlich berichtet. In dieser Publikation werden zum ersten Mal die Merkmale zur Unterscheidung der Verwandtschaft des Ackerhornkrautes mit entsprechenden Illustrationen dargestellt, so dass eine Bestimmung dieses schwierigen Verwandtschaftskreises gut möglich ist. Nach derzeitigem Wissensstand ist *C. arvense* ssp. *suffruticosum* im Ostalpenraum hauptsächlich eine Pflanze der dynamischen Alluvionen und weist eine durchaus ähnliche Ökologie wie die Deutsche Ufertamariske (*Myricaria germanica*) und das Uferreitgras (*Calamagrostis pseudophragmites*) auf (vgl. auch Wittmann & Pflugbeil 2017). Im Tal der Schwarzach war die Art durch Nachweise des Autors (in Stöhr et al. 2006) bereits bekannt, nunmehr konnte

diese seltene Unterart auch im Oberlauf bis hin zur Oberhausalm mehrfach nachgewiesen werden. Nach Kenntnis des Autors sind die Vorkommen von *C. arvense* ssp. *suffruticosum* im Tal der Schwarzach die größten in Österreich.

Erwähnenswert ist, dass ein Teil der, bei STÖHR et al. (2006) angeführten Nachweise aus Osttirol in den Nachtragsband 6 der Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg (POLATSCHKEK & NEUNER 2013a) übernommen wurden, wobei als Quelle die österreichische Chromosomenzahlen-Checklist (DOBEŠ & VITEK 2000) angeführt wird. Bei DOBEŠ & VITEK (2000) wird *Cerastium arvense* ssp. *strictum* jedoch nicht angeführt. Über die Bestätigung von Vorkommen aus dem benachbarten Südtirol, von wo Nachweise dieser Unterart lange Zeit angezweifelt wurden, berichten WILHALM et al. (2009).

Abbildung 16: Die dunkel-purpurbraun gefärbten Spelzen mit ihrem breiten, weißen, oft fransig-gewimperten Hautrand machen die Heide-Segge unverwechselbar (Foto: Helmut Wittmann).

***Cyanus montanus* (Berg-Flockenblume)**

Von *Cyanus montanus* (Abb. 17) sind in der Flora von Tirol (POLATSCHKE 1997) keine Nachweise aus Osttirol eingetragen. Im Kärntner Verbreitungsatlas (HARTL et al. 1992) reicht die Art jedoch von Osten kommend bis unmittelbar an die Osttiroler Grenze mit mehreren Angaben heran. Am Tag der Artenvielfalt im Jahr 2013 konnte Oliver Stöhr *C. montanus* im Umbaltal feststellen, im Ergänzungsband 6 zur Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg (POLATSCHKE & NEUNER 2013a) findet sich eine Angabe aus dem Patschertal, am Tag der Artenvielfalt 2017 gelang dem Autor ein Fund dieser Art westlich von Erlsbach an der Fahrstraße zur Oberhaus-Alm. Augenscheinlich handelt es sich um ein natürliches Vorkommen, einen Hinweis auf eine Verwilderung kann nicht erkannt werden. Soweit wir die Literatur überblicken, liegt damit der Drittfund für Osttirol vor.

Abbildung 17: Die Berg-Flockenblume wurde erst wenige Male in Osttirol nachgewiesen (Foto: Helmut Wittmann).

***Gentiana prostrata* (Liegender Enzian)**

Von *Gentiana prostrata* sind in der Verbreitungskarte der Tirol-Flora von POLATSCHKE (2000) nur 6 aktuelle Nachweise vermerkt, im Ergänzungsband 6 zur Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg (POLATSCHKE & NEUNER 2013a) scheinen jedoch Nachweise aus dem Schwarzach-Tal auf, die auf Geländenotizen von Adolf Polatschek zurückgehen. Im Zuge des Tages der Artenvielfalt konnte die Art nordnordwestlich der Jagdhausalmen am Aufstieg zum Hörnle festgestellt werden. Generell dürfte der Liegende Enzian jedoch weiter verbreitet sein, ist jedoch aufgrund seiner Kleinheit, der unscheinbaren Blüten, des unscheinbaren Wuchses und auch wegen dem sofortigen Schließen der Blüten bei jeglicher Beschattung nur schwer zu finden.

***Gentiana utriculosa* (Schlauch-Enzian)**

Gentiana utriculosa (Abb. 18) ist – wie die Verbreitungskarte bei POLATSCHKE (1999) zeigt – in Osttirol nur in den südlichen Landesteilen etwas häufiger. Im Defereggental inklusive dem oberen Schwarzach- und Arvental lag bisher nur ein Nachweis im Ergänzungsband 6 zur Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg (POLATSCHKE & NEUNER 2013a) am Klammljoch vor. Das in Teilbereichen anstehende Kalkgestein im weiteren Umfeld der Jagdhausalm ermöglicht jedoch dieser kalkliebenden Art das Vorkommen in diesem Gebiet.

Abbildung 18: An seiner eigenartigen Flügelung des Kelches kann man den Schlauch-Enzian leicht erkennen (Foto: Helmut Wittmann).

***Hordeum jubatum* (Mähnen-Gerste)**

Von diesem aus Amerika stammenden Neubürger lag entsprechend der Verbreitungskarte bei POLATSCHKE (1999) erst ein Nachweis aus dem östlichsten Osttirol vor, auch im Ergänzungsband 7 zur Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg (POLATSCHKE & NEUNER 2013b) finden sich keine weiteren osttiroler Vorkommen. Der Fund in der Nähe von St. Jakob im Deferegggen stellt somit den zweiten Nachweis dieses Neophyten in Osttirol dar. Die Literatur über Vorkommen dieser Art in Österreich wurde kürzlich von ENGLMAIER & WILHALM (2018) zusammengefasst.

***Jovibarba globifera* ssp. *pseudohirta* (Behaarte Sand-Fransenhauswurz)**

Diese Unterart von *Jovibarba globifera* wurde von LEUTE (1966) unter dem Namen *Diopogon arenarius* (Koch) Leute ssp. *pseudohirtus* Leute erstmals beschrieben (LEUTE 1966). Die Unterart zeichnet sich durch Stängelblätter aus, die schmaler als die Rosettenblätter sind und Rosetten- sowie Stängelblätter, die am Rand relativ lange Wimpern (0,5 bis 0,8 mm) tragen. Die Sippe lässt sich vergleichsweise einfach bestimmen und wurde von Wilfried Franz sowie auch vom Autor am Tag der Artenvielfalt unabhängig voneinander kartiert und belegt. Bei FISCHER et al. (2008) wird vermutet, dass es sich bei dieser Unterart um einen Endemiten im Bereich Osttirol und nordöstliches Südtirol handelt, diese Ansicht vertreten auch WILHALM & HILPOLD (2006). Über einen Wiederfund dieser Unterart bei Sillian berichtet ZIDORN (2007). Bei POLATSCHKE (1999) und bei POLATSCHKE & NEUNER (2013a) scheint diese Art für Tirol nicht auf. Bemerkenswert sind die Funde durch ihre Lage über 2.000 Meter, eine Seehöhe, in der andere Vertreter von *Jovibarba arenaria* nicht oder kaum mehr vorkommen.

***Oxytropis lapponica* (Lapland-Spitzkiel)**

Wie die Verbreitungskarte dieser Art bei POLATSCHKE (2000) und die Angaben bei POLATSCHKE & NEUNER (2013a) zeigen, lagen von *Oxytropis lapponica* (Abb. 19) bisher keine Nachweise aus dem Deferegggen- bzw. Schwarzachtal vor. Der Nachweis von Susanne und Oliver Stöhr stellt somit den Erstdnachweis für dieses Gebiet dar.

Abbildung 19: Auch der seltene Lappland-Spitzkiel wurde am Tag der Artenvielfalt im hinteren Schwarzachtal nachgewiesen (Foto: Helmut Wittmann).

***Sempervivum wulfenii* (Wulfen-Hauswurz)**

Von der auffällig gelbblühenden *Sempervivum wulfenii* (Abb. 20) lagen aus Osttirol bisher nur wenige zerstreute Funde vor (POLATSCHKE 1999, POLATSCHKE & NEUNER 2013a), die durch die Nachweise im Umfeld der Jagdhausalmen ergänzt bzw. aktualisiert werden konnten.

Abbildung 20: Wulfens-Hauswurz mit ihrem aus gelben Einzelblüten zusammengesetztem, attraktivem Blütenstand (Foto: Helmut Wittmann).

***Taraxacum pacheri* (Pacher-Löwenzahn)**

Unter den durchaus als schwierig zu bestimmenden *Taraxacum*-Arten ist *Taraxacum pacheri* im blühenden Zustand durch die orange-rote Blütenfarbe gut kenntlich. *T. pacheri* wurde auf dem Hörnle nördlich der Jagdhausalmen im Jahr 2006 zum ersten Mal nachgewiesen (H. Wittmann in STÖHR et al. 2009) und konnte nunmehr bestätigt werden. Der Fund ist insofern bemerkenswert, da in der Flora von POLATSCHKE (1999) und auch im Ergänzungsband 6 (POLATSCHKE & NEUNER 2013a) keine aktuellen Nachweise dieser Löwenzahnart angeführt werden.

***Trisetum distichophyllum* (Zweizeiliger Grannenhafer)**

In der Tirol-Flora von MAIER et al. (2001) findet sich von dieser kalkliebenden Grasart nur eine ältere Angabe aus dem gesamten Schwarzach-Defereggental. In lokal kalkführenden Gesteinsformationen nördlich oberhalb der Jagdhausalmen konnte diese Angabe am Tag der Artenvielfalt aktuell bestätigt und im Herbarium am Haus der Natur belegt werden.

Tabelle 6: Nachweise von Blütenpflanzen und Farnen, die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Blütenpflanze und Farne)	Deutscher Name
Apiaceae	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Geißfuß
Apiaceae	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Wild-Engelwurz
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Wiesen-Kerbel
Apiaceae	<i>Carum carvi</i> L.	Echt-Kümmel
Apiaceae	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	Wimper-Kälberkropf
Apiaceae	<i>Chaerophyllum villarsii</i> Koch	Alpen-Kälberkropf
Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	Möhre
Apiaceae	<i>Heracleum sphondylium</i> L. ssp. <i>elegans</i> (Cr.) Schübl. & Mart.	Berg-Wiesen-Bärenklau
Apiaceae	<i>Heracleum sphondylium</i> L. ssp. <i>sphondylium</i>	Gewöhnliche Wiesen-Bärenklau
Apiaceae	<i>Laserpitium latifolium</i> L.	Breitblatt-Laserkraut
Apiaceae	<i>Mutellina adonidifolia</i>	Alpen-Mutterwurz
Apiaceae	<i>Pachypleurum mutellinoides</i>	Einfach-Zwergmutterwurz
Apiaceae	<i>Pastinaca sativa</i> L.	Echt-Pastinak
Apiaceae	<i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) Koch	Meisterwurz
Apiaceae	<i>Pimpinella major</i> var. <i>major</i>	Weißer Groß-Bibernelle
Aspleniaceae	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Mauer-Streifenfarn
Asteraceae	<i>Achillea atrata</i> L.	Schwarzrand-Schafgarbe
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Eigentliche Echt-Schafgarbe
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L. ssp. <i>millefolium</i>	Gewöhnliche Echt-Schafgarbe
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L. ssp. <i>sudetica</i> (Opiz) Weiß	Gebirgs-Echt-Schafgarbe
Asteraceae	<i>Achillea moschata</i> Wulfen	Moschus-Schafgarbe
Asteraceae	<i>Achillea ptarmica</i> L.	Bertram-Schafgarbe
Asteraceae	<i>Antennaria carpatica</i> (Wahlenb.) Bluff & Fing.	Karpaten-Katzenpfötchen
Asteraceae	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Gewöhnlich-Katzenpfötchen
Asteraceae	<i>Anthemis arvensis</i> L.	Acker-Hundskamille
Asteraceae	<i>Arnica montana</i> L.	Arnika
Asteraceae	<i>Artemisia genipi</i> Web.	Schwarz-Edelraute
Asteraceae	<i>Artemisia mutellina</i> Vill.	Echt-Edelraute
Asteraceae	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Echt-Beifuß
Asteraceae	<i>Aster alpinus</i> L.	Alpen-Aster
Asteraceae	<i>Bellidiastrum michelii</i>	Sternlieb
Asteraceae	<i>Carduus defloratus</i> L.	Berg-Ringdistel
Asteraceae	<i>Carduus defloratus</i> L. ss. <i>Kazmi</i> ssp. <i>tridentinus</i> (Evers) Ladurner	Trientiner Berg-Ringdistel
Asteraceae	<i>Carduus personata</i> (L.) Jacq.	Kletten-Ringdistel
Asteraceae	<i>Carlina acaulis</i> L. ssp. <i>acaulis</i>	Gewöhnliche Groß-Eberwurz
Asteraceae	<i>Centaurea jacea</i> L. ssp. <i>jacea</i>	Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume
Asteraceae	<i>Centaurea pseudophrygia</i> C. A. Mey. ex Rupr.	Gewöhnliche Perücken-Flockenblume
Asteraceae	<i>Chlorocrepis stasticifolia</i> (All.) Griseb.	Strandnelkenhabichtskraut
Asteraceae	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Acker-Kratzdistel
Asteraceae	<i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop.	Kleb-Kratzdistel
Asteraceae	<i>Cirsium heterophyllum</i> (L.) Hill	Filz-Kratzdistel
Asteraceae	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Sumpf-Kratzdistel
Asteraceae	<i>Cirsium spinosissimum</i> (L.) Scop.	Alpen-Kratzdistel
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Lanzen-Kratzdistel
Asteraceae	<i>Crepis aurea</i> (L.) Cass.	Gold-Pippau
Asteraceae	<i>Crepis biennis</i> L.	Wiesen-Pippau
Asteraceae	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench	Sumpf-Pippau
Asteraceae	<i>Cyanus montanus</i>	Berg-Blauflockenblume
Asteraceae	<i>Doronicum clusii</i> (All.) Tausch	Clusius-Gemswurz
Asteraceae	<i>Doronicum glaciale</i> (Wulfen) Nyman	Gletscher-Gamswurz
Asteraceae	<i>Erigeron acris</i> L. ssp. <i>acris</i>	Gewöhnliches Scharf-Berufkraut
Asteraceae	<i>Erigeron alpinus</i> L.	Alpen-Berufkraut
Asteraceae	<i>Erigeron glabratus</i> Bluff & Fingerh.	Kahl-Berufkraut
Asteraceae	<i>Erigeron uniflorus</i> L.	Einkopf-Berufkraut
Asteraceae	<i>Galinsoga ciliata</i> (Raf.) S. F. Blake	Zotten-Franzosenkraut
Asteraceae	<i>Gnaphalium supinum</i> L.	Zwerg-Ruhrkraut
Asteraceae	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Sumpf-Ruhrkraut
Asteraceae	<i>Hieracium alpinum</i> L.	Alpen-Habichtskraut
Asteraceae	<i>Hieracium angustifolium</i> Hoppe	Gletscher-Mausohrhabichtskraut
Asteraceae	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	Orange-Mausohrhabichtskraut
Asteraceae	<i>Hieracium glanduliferum</i> Hoppe	Grauzotten-Habichtskraut
Asteraceae	<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	Öhrchen-Mausohrhabichtskraut
Asteraceae	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	Dreizahn-Habichtskraut
Asteraceae	<i>Hieracium murorum</i> L.	Wald-Habichtskraut
Asteraceae	<i>Hieracium pilosella</i> L.	Klein-Mausohrhabichtskraut
Asteraceae	<i>Hieracium pilosum</i> Schleich. ex Froel.	Wollkorb-Habichtskraut
Asteraceae	<i>Hieracium prenanthoides</i> Vill.	Hasenlattich-Habichtskraut
Asteraceae	<i>Hieracium sphaerocephalum</i> Froel.	Rundkopf-Mausohrhabichtskraut
Asteraceae	<i>Hieracium villosum</i> Jacq.	Zotten-Habichtskraut
Asteraceae	<i>Homogyne alpina</i> (L.) Cass.	Alpen-Brandlätich
Asteraceae	<i>Hypochaeris uniflora</i> VILL.	Einkorb-Ferkelkraut
Asteraceae	<i>Leontodon helveticus</i> Mérat emend. Widd.	Schweizer Löwenzahn
Asteraceae	<i>Leontodon hispidus</i> L.	Gewöhnlich-Nickleuzahn

Familie	Taxa (Blütenpflanze und Farne)	Deutscher Name
Asteraceae	Leontopodium alpinum Cass.	Alpen-Edelweiß
Asteraceae	Leucanthemopsis alpina (L.) Heyw.	Alpenmargerite
Asteraceae	Leucanthemum ircutianum DC.	Große Wiesen-Margerite
Asteraceae	Matricaria discoidea DC.	Knopf-Kamille
Asteraceae	Petasites albus (L.) Gaertn.	Weiß-Pestwurz
Asteraceae	Petasites hybridus (L.) G., M. & Sch.	Bach-Pestwurz
Asteraceae	Saussurea alpina (L.) DC.	Gewöhnlich-Alpenscharte
Asteraceae	Scorzoneroides autumnalis (L.)	Herbst-Schuppenleuzahn
Asteraceae	Scorzoneroides helvetica	Schweiz-Schuppenleuzahn
Asteraceae	Senecio carniolicus Willdenow agg.	Sammelart Krainer Greiskraut
Asteraceae	Senecio doronicum (L.) L.	Gamswurz-Greiskraut
Asteraceae	Senecio ovatus (G. Gärt. & al.) Willd.	Fuchs-Hain-Greiskraut
Asteraceae	Senecio vulgaris L.	Gewöhnlich-Greiskraut
Asteraceae	Solidago canadensis L.	Kanada-Goldrute
Asteraceae	Solidago virgaurea L.	Echt-Goldrute
Asteraceae	Solidago virgaurea L. ssp. minuta (L.) Arc.	Alpen-Goldrute
Asteraceae	Sonchus arvensis L.	Acker-Gänsedistel
Asteraceae	Sonchus asper (L.) Hill	Dorn-Gänsedistel
Asteraceae	Sonchus oleraceus L.	Gemüse-Gänsedistel
Asteraceae	Taraxacum officinale agg.	Sammelart Wiesen-Löwenzahn
Asteraceae	Taraxacum pacheri C. H. Schultz	Pacher-Löwenzahn
Asteraceae	Tripleurospermum inodorum (L.) C. H. Schultz	Geruchlos-Ruderalkamille
Asteraceae	Tussilago farfara L.	Huflattich
Asteraceae	Willemetia stipitata (Jacq.) Dalla Torre	Kronlattich
Berberidaceae	Berberis vulgaris L.	Echte Berberitze
Betulaceae	Alnus alnobetula (Ehrh.) Hartig	Grün-Erle
Betulaceae	Alnus incana (L.) Moench	Grau-Erle
Betulaceae	Betula pendula Roth	Hänge-Birke
Betulaceae	Betula pubescens Ehrh. ssp. carpatica (Waldst. & Kit. ex Willd.)	Gebirgs-Birke
Betulaceae	Betula pubescens Ehrh. ssp. czerepanovii (N.I.Orlova) Hämet-Ahti	Fjell-Birke
Betulaceae	Corylus avellana L.	Gewöhnlich-Haselnuss
Boraginaceae	Myosotis alpestris F. W. Schmidt	Alpen-Vergissmeinnicht
Boraginaceae	Myosotis palustris agg.	Sammelart Sumpf-Vergissmeinnicht
Brassicaceae	Arabis alpina L.	Alpen-Gänsekresse
Brassicaceae	Arabis bellidifolia Jacq.	Gabelhaar-Zwerg-Gänsekresse
Brassicaceae	Arabis caerulea All.	Blau-Gänsekresse
Brassicaceae	Arabis soyeri Reut. & Huet ssp. subcoriacea (Gren.) Breistr.	Alpen-Bach-Gänsekresse
Brassicaceae	Armoracia lapathifolia	Krenn
Brassicaceae	Barbarea vulgaris R. Br.	Echt-Barbarakraut
Brassicaceae	Biscutella laevigata L.	Glatt-Brillenschötchen
Brassicaceae	Cardamine amara L.	Kressen-Schaumkraut
Brassicaceae	Cardamine resedifolia L.	Reseda-Schaumkraut
Brassicaceae	Draba aizoides L.	Immergrün-Felsenblümchen
Brassicaceae	Erysimum sylvestre (Cr.) Scop.	Felsen-Goldlack
Brassicaceae	Hornungia alpina ssp. brevicaulis	Silikat-Gamskresse
Brassicaceae	Rorippa palustris (L.) Besser emend. Jons.	Gewöhnlich-Sumpfkresse
Brassicaceae	Thlaspi arvense L.	Acker-Hellerkraut
Callitricheaceae	Callitriche palustris L. emend. Schotsman agg.	Sammelart Sumpf-Wasserstern
Campanulaceae	Campanula barbata L.	Bart-Glockenblume
Campanulaceae	Campanula cochlearifolia Lam.	Zwerg-Glockenblume
Campanulaceae	Campanula patula L.	Wiesen-Glockenblume
Campanulaceae	Campanula scheuchzeri Vill.	Scheuchzer-Glockenblume
Campanulaceae	Campanula trachelium L.	Nessel-Glockenblume
Campanulaceae	Phyteuma betonicifolium Vill.	Betonien-Teufelskralle
Campanulaceae	Phyteuma globulariifolium Sternb. & Hoppe ssp. globulariifolium	Östliche Wenigblüten-Teufelskralle
Campanulaceae	Phyteuma hemisphaericum L.	Grasblatt-Teufelskralle
Campanulaceae	Phyteuma spicatum L. ssp. spicatum	Gewöhnliche Ähren-Teufelskralle
Caprifoliaceae	Lonicera caerulea L.	Blau-Heckenkirsche
Caryophyllaceae	Arenaria biflora L.	Zweiblüten-Sandkraut
Caryophyllaceae	Arenaria ciliata L. emend. L.	Eigentliches Wimper-Sandkraut
Caryophyllaceae	Atocion rupestre (L.) Oxelman	Gewöhnlich-Felsenleimkraut
Caryophyllaceae	Cerastium arvense L.	Acker-Hornkraut
Caryophyllaceae	Cerastium arvense L. ssp. strictum (L.) Gaudin	Steif-Acker-Hornkraut
Caryophyllaceae	Cerastium arvense L. ssp. suffruticosum (L.) Nyman	Südalpen-Acker-Hornkraut
Caryophyllaceae	Cerastium cerastoides (L.) Britton	Dreigriffel-Hornkraut
Caryophyllaceae	Cerastium fontanum Baumg.	Quell-Hornkraut
Caryophyllaceae	Cerastium holosteoides Fries emend. Hyl.	Gewöhnlich-Hornkraut
Caryophyllaceae	Cerastium uniflorum Clairv.	Silikat-Hornkraut
Caryophyllaceae	Dianthus glacialis Haenke	Gletscher-Nelke
Caryophyllaceae	Dianthus sylvestris Wulfen	Wild-Nelke
Caryophyllaceae	Gypsophila repens L.	Kriech-Gipskraut
Caryophyllaceae	Herniaria glabra L.	Kahl-Bruchkraut
Caryophyllaceae	Lychnis flos-cuculi L.	Gewöhnlich-Kuckucksnelke
Caryophyllaceae	Minuartia gerardii (Willd.) Hayek	Alpen-Frühlings-Miere
Caryophyllaceae	Minuartia rupestris (Scop.) Schinz & Thell.	Felsen-Miere
Caryophyllaceae	Minuartia sedoides (L.) Hiern.	Zwerg-Miere

Familie	Taxa (Blütenpflanze und Farne)	Deutscher Name
Caryophyllaceae	Moehringia ciliata (Scop.) DT.	Wimper-Nabelmiere
Caryophyllaceae	Sagina procumbens L.	Liege-Mastkraut
Caryophyllaceae	Sagina saginoides (L.) Karsten	Alpen-Mastkraut
Caryophyllaceae	Silene acaulis (L.) Jacq.	Stängellos-Leimkraut
Caryophyllaceae	Silene acaulis (L.) Jacq. ssp. exscapa	Kiesel-Stängellos-Leimkraut
Caryophyllaceae	Silene acaulis (L.) Jacq. ssp. longiscapa	Kalk-Stängellos-Leimkraut
Caryophyllaceae	Silene dioica (L.) Clairv.	Rot-Leimkraut
Caryophyllaceae	Silene nutans L.	Nickend-Leimkraut
Caryophyllaceae	Silene vulgaris (Moench) Garcke	Blasen-Leimkraut
Caryophyllaceae	Silene vulgaris (Moench) Garcke ssp. vulgaris	Gewöhnliches Blasen-Leimkraut
Caryophyllaceae	Spergularia marina (L.) Besser	Salz-Schuppenmiere
Caryophyllaceae	Stellaria graminea L.	Gras-Sternmiere
Chenopodiaceae	Chenopodium album L.	Weiß-Gänsefuß
Chenopodiaceae	Chenopodium bonus-henricus L.	Guter Heinrich
Cistaceae	Helianthemum alpestre (Jacq.) DC.	Alpen-Sonnenröschen
Cistaceae	Helianthemum nummularium (L.) Mill. ssp. grandiflorum (Scop.)	Großblütiges-Gewöhnlich-Sonnenröschen
Crassulaceae	Jovibarba globifera ssp. pseudohirta	Kugel-Fransenhauswurz
Crassulaceae	Sedum album L.	Weiß-Mauerpfeffer
Crassulaceae	Sedum alpestre Vill.	Alpen-Mauerpfeffer
Crassulaceae	Sedum atratum L.	Dunkel-Mauerpfeffer
Crassulaceae	Sedum atratum L. ssp. atratum	Eigentlicher Dunkel-Mauerpfeffer
Crassulaceae	Sedum sexangulare L. emend. Grimm	Mild-Mauerpfeffer
Crassulaceae	Sempervivum arachnoideum L.	Spinnweben-Hauswurz
Crassulaceae	Sempervivum montanum L.	Westliche Berg-Hauswurz
Crassulaceae	Sempervivum wulfenii Hoppe ex Mert. & Koch	Wulfen-Hauswurz
Cupressaceae	Juniperus communis L.	Echt-Wacholder
Cupressaceae	Juniperus communis L. ssp. nana (Willd.) Syme	Zwerg-Wacholder
Cyperaceae	Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link	Quetsch-Quellbinse
Cyperaceae	Carex atrata L.	Trauer-Segge
Cyperaceae	Carex bicolor All.	Zweifارben-Segge
Cyperaceae	Carex canescens L.	Grau-Segge
Cyperaceae	Carex capillaris L.	Haarstiel-Segge
Cyperaceae	Carex caryophyllea Latourr.	Frühlings-Segge
Cyperaceae	Carex curvula All. ssp. curvula	Silikat-Krumm-Segge
Cyperaceae	Carex davalliana Sm.	Davall-Segge
Cyperaceae	Carex dioica L.	Zweihäusig-Segge
Cyperaceae	Carex echinata Murray	Igel-Segge
Cyperaceae	Carex elata All.	Steif-Segge
Cyperaceae	Carex ericetorum Pollich	Heide-Segge
Cyperaceae	Carex ferruginea Scop.	Rost-Segge
Cyperaceae	Carex firma Mygind	Polster-Segge
Cyperaceae	Carex flava L.	Große Gelb-Segge
Cyperaceae	Carex flava L. agg.	Sammelart Große Gelb-Segge
Cyperaceae	Carex flava L. var. alpina Kneuck.	Hochgebirgsrasse der Großen Gelb-Segge
Cyperaceae	Carex frigida All.	Kälte-Segge
Cyperaceae	Carex hirta L.	Rauhaar-Segge
Cyperaceae	Carex lepidocarpa Tausch	Mittlere Gelb-Segge
Cyperaceae	Carex leporina L.	Hasen-Segge
Cyperaceae	Carex mucronata All.	Stachelspitz-Segge
Cyperaceae	Carex nigra (L.) Reichard	Braun-Segge
Cyperaceae	Carex oederi	Kleine Gelb-Segge
Cyperaceae	Carex pallescens L.	Bleich-Segge
Cyperaceae	Carex panicea L.	Hirse-Segge
Cyperaceae	Carex paniculata L.	Rispen-Segge
Cyperaceae	Carex parviflora Host	Kleinblüten-Segge
Cyperaceae	Carex paupercula Michx.	Riesel-Segge
Cyperaceae	Carex pilulifera L.	Pillen-Segge
Cyperaceae	Carex rostrata Stokes ex With.	Schnabel-Segge
Cyperaceae	Carex sempervirens Vill.	Horst-Segge
Cyperaceae	Eleocharis quinqueflora (F. X. Hartm.) O. Schwarz	Wenigblüten-Sumpfried
Cyperaceae	Eriophorum angustifolium Honck.	Schmalblatt-Wollgras
Cyperaceae	Eriophorum latifolium Hoppe	Breitblatt-Wollgras
Cyperaceae	Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori	Nacktried
Cyperaceae	Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack.	Schuppenried
Cyperaceae	Trichophorum cespitosum (L.) Hartman	Rasen-Haarbinse
Cyperaceae	Carex ornithopodioides	Alpen-Vogelfuß-Segge
Dennstaedti-	Pteridium aquilinum (L.) Kuhn	Adlerfarn
Dipsacaceae	Scabiosa columbaria L. agg.	Sammelart Tauben-Skabiose
Dipsacaceae	Scabiosa lucida Vill.	Glanz-Skabiose
Dryopteridaceae	Athyrium filix-femina (L.) Roth	Wald-Frauenfarn
Dryopteridaceae	Cystopteris fragilis (L.) Bernh.	Bruch-Blasenfarn
Dryopteridaceae	Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs	Klein-Dornfarn
Dryopteridaceae	Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy	Gebirgs-Dornfarn
Dryopteridaceae	Dryopteris filix-mas (L.) Schott	Echt-Wurmfarn
Dryopteridaceae	Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.	Eichenfarn
Dryopteridaceae	Polystichum lonchitis (L.) Roth	LANZEN-Schildfarn

Familie	Taxa (Blütenpflanze und Farne)	Deutscher Name
Equisetaceae	Equisetum fluviatile L.	Teich-Schachtelhalm
Equisetaceae	Equisetum palustre L.	Sumpf-Schachtelhalm
Equisetaceae	Equisetum variegatum Schleich. ex Web. & Mohr	Bunt-Schachtelhalm
Equisetaceae	Equisetum arvense ssp. arvense	Gewöhnlicher Acker-Schachtelhalm
Equisetaceae	Equisetum palustre x variegatum	Hybride Sumpf- mit Bunt-Schachtelhalm
Ericaceae	Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.	Arznei-Bärentraube
Ericaceae	Calluna vulgaris (L.) Hull	Besenheide
Ericaceae	Empetrum hermaphroditum Hagerup	Zwitter-Krähenbeere
Ericaceae	Erica carnea L.	Schnee-Heide
Ericaceae	Loiseleuria procumbens (L.) Desv.	Gamsheide
Ericaceae	Pyrola minor L.	Klein-Wintergrün
Ericaceae	Rhododendron (x) intermedium	Bastard-Alpenrose
Ericaceae	Rhododendron ferrugineum L.	Rost-Alpenrose
Ericaceae	Rhododendron hirsutum L.	Wimper-Alpenrose
Ericaceae	Vaccinium gaultherioides Bigelow	Alpen-Nebelbeere
Ericaceae	Vaccinium myrtillus L.	Heidelbeere
Ericaceae	Vaccinium vitis-idaea L.	Preiselbeere
Fabaceae	Anthyllis vulneraria L. ssp. alpicola	Alpen-Echt-Wundklee
Fabaceae	Astragalus alpinus L.	Alpen-Tragant
Fabaceae	Astragalus australis (L.) Lam.	Süd-Tragant
Fabaceae	Astragalus frigidus (L.) A. Gray	Kälte-Tragant
Fabaceae	Astragalus penduliflorus Lam.	Hänge-Tragant
Fabaceae	Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz & Thell.	Alpen-Süßklee
Fabaceae	Hippocrepis comosa L.	Gewöhnlich-Hufeisenklee
Fabaceae	Lathyrus pratensis L.	Wiesen-Platterbse
Fabaceae	Lotus corniculatus L.	Wiesen-Hornklee
Fabaceae	Lotus corniculatus var. alpicola	Ostalpen-Wiesen-Hornklee
Fabaceae	Lupinus polyphyllus Lindl.	Stauden-Lupine
Fabaceae	Melilotus albus Medik.	Weiß-Steinklee
Fabaceae	Oxytropis campestris (L.) DC.	Alpen-Spitzkiel
Fabaceae	Oxytropis campestris (L.) DC. ssp. campestris	Feld-Spitzkiel ssp. campestris, Alpen-Spitzkiel
Fabaceae	Oxytropis halleri Bunge ex Koch	Gewöhnlicher Seidenhaar-Spitzkiel
Fabaceae	Oxytropis lapponica (Wahlenb.) J. Gay	Lappland-Spitzkiel
Fabaceae	Trifolium badium Schreb.	Braun-Klee
Fabaceae	Trifolium campestre Schreb.	Feld-Klee
Fabaceae	Trifolium hybridum L.	Schweden-Klee
Fabaceae	Trifolium pallescens Schreb.	Moränen-Klee
Fabaceae	Trifolium pratense L. ssp. nivale Arc.	Schneeweißer Wiesen-Klee
Fabaceae	Trifolium pratense L. ssp. pratense	Gewöhnlicher Wiesen-Klee
Fabaceae	Trifolium repens L.	Kriech-Klee
Fabaceae	Vicia cracca L.	Vogel-Wicke
Gentianaceae	Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok.	Zart-Haarschlund
Gentianaceae	Gentiana acaulis L.	Silikat-Glocken-Enzian
Gentianaceae	Gentiana asclepiadea L.	Schwalbenwurz-Enzian
Gentianaceae	Gentiana bavarica L.	Bayern-Enzian
Gentianaceae	Gentiana bavarica L. var. subacaulis	Kleinwüchsiger Bayern-Enzian
Gentianaceae	Gentiana clusii Perr. & Song.	Kalk-Glocken-Enzian
Gentianaceae	Gentiana nivalis L.	Schnee-Enzian
Gentianaceae	Gentiana prostrata Haenke	Liegend-Enzian
Gentianaceae	Gentiana punctata L.	Tüpfel-Enzian
Gentianaceae	Gentiana utriculosa L.	Schlauch-Enzian
Gentianaceae	Gentiana verna L.	Frühlings-Enzian
Gentianaceae	Gentianella rhaetica	Rätisch-Kranzenzian
Geraniaceae	Geranium pratense L.	Wiesen-Storchschnabel
Geraniaceae	Geranium sylvaticum L.	Wald-Storchschnabel
Globulariaceae	Globularia cordifolia L.	Herz-Kugelblume
Grossulariaceae	Ribes alpinum L.	Alpen-Ribisel
Grossulariaceae	Ribes petraeum Wulfen	Felsen-Ribisel
Hypericaceae	Hypericum maculatum Cr.	Flecken-Johanniskraut
Juncaceae	Juncus alpinoarticulatus Chaix	Gebirgs-Simse
Juncaceae	Juncus articulatus L.	Glieder-Simse
Juncaceae	Juncus effusus L.	Flatter-Simse
Juncaceae	Juncus filiformis L.	Faden-Simse
Juncaceae	Juncus jacquinii L.	Jacquin-Simse
Juncaceae	Juncus trifidus L.	Dreiblatt-Simse
Juncaceae	Juncus triglumis L.	Dreibluten-Simse
Juncaceae	Luzula alpina Hoppe	Alpen-Hainsimse
Juncaceae	Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr.	Braun-Hainsimse
Juncaceae	Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilm.	Weiß-Hainsimse
Juncaceae	Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.	Vielblüten-Hainsimse
Juncaceae	Luzula spicata (L.) DC.	Ähren-Hainsimse
Juncaceae	Luzula spicata (L.) DC. ssp. mutabilis	Veränderliche Ähren-Hainsimse
Juncaceae	Luzula sudetica (Willd.) Schult.	Sudeten-Hainsimse
Juncaceae	Luzula sylvatica (Huds.) Gaud.	Groß-Hainsimse
Juncaceae	Luzula luzuloides var. erythranthema	Gebirgs-Weiß-Hainsimse
Juncaginaceae	Triglochin palustre L.	Sumpf-Dreizack

Familie	Taxa (Blütenpflanze und Farne)	Deutscher Name
Lamiaceae	Acinos alpinus (L.) Moench	Alpen-Steinquendel
Lamiaceae	Ajuga pyramidalis L.	Pyramiden-Günsel
Lamiaceae	Clinopodium alpinum	Alpen-Steinquendel
Lamiaceae	Galeopsis tetrahit L.	Dorn-Hohlzahn
Lamiaceae	Glechoma hederacea L.	Echt-Gundelrebe
Lamiaceae	Lamium album L.	Weiß-Taubnessel
Lamiaceae	Prunella vulgaris L.	Klein-Brunelle
Lamiaceae	Stachys sylvatica L.	Wald-Ziest
Lamiaceae	Thymus praecox Opiz	Kriech-Quendel
Lamiaceae	Thymus praecox Opiz ssp. polytrichus (Kem. ex Borb.) Ronn.	Gebirgs-Kriech-Quendel
Lamiaceae	Thymus pulegioides L.	Arznei-Quendel
Lentibulariaceae	Pinguicula alpina L.	Alpen-Fettkraut
Lentibulariaceae	Pinguicula leptoceras Rchb.	Dünnsporn-Fettkraut
Lentibulariaceae	Pinguicula vulgaris L.	Gewöhnlich-Fettkraut
Liliaceae	Lilium martagon L.	Türkenbund-Lilie
Linaceae	Linum catharticum L.	Purgier-Lein
Lycopodiaceae	Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.	Tannen-Teufelsklaue
Lycopodiaceae	Lycopodium clavatum L. ssp. clavatum	Gewöhnlicher Kolben-Bärlapp
Melanthiaceae	Veratrum album L.	Weiß-Germer
Melanthiaceae	Veratrum album L. ssp. lobelianum (Bernh.) Arc.	Grüner Weiß-Germer
Onagraceae	Epilobium alpestre (Jacq.) Krock.	Quirl-Weidenröschen
Onagraceae	Epilobium alsinifolium Vill.	Mieren-Weidenröschen
Onagraceae	Epilobium anagallidifolium Lam.	Gauchheil-Weidenröschen
Onagraceae	Epilobium angustifolium L.	Schlag-Weidenröschen
Onagraceae	Epilobium ciliatum Raf.	Amerika-Weidenröschen
Onagraceae	Epilobium montanum L.	Berg-Weidenröschen
Onagraceae	Epilobium nutans F. W. Schmidt	Nickend-Weidenröschen
Onagraceae	Epilobium palustre L.	Sumpf-Weidenröschen
Ophioglossaceae	Botrychium lunaria (L.) Sw.	Mond-Rautenfarn
Ophioglossaceae	Botrychium simplex E. Hitchc.	Einfach-Rautenfarn
Orchidaceae	Chamorchis alpina (L.) Rich.	Zwergstängel
Orchidaceae	Coeloglossum viride (L.) Hartman	Hohlzunge
Orchidaceae	Dactylorhiza maculata (L.) Soó	Flecken-Fingerwurz
Orchidaceae	Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt & Summerh.	Breitblatt-Fingerwurz
Orchidaceae	Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt & Summerh. ssp. alpestris	Alpen-Breitblatt-Fingerwurz
Orchidaceae	Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.	Mücken-Händelwurz
Orchidaceae	Gymnadenia conopsea x odoratissima	Hybride Mücken- mit Duft-Händelwurz
Orchidaceae	Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.	Duft-Händelwurz
Orchidaceae	Nigritella rhellucani Teppn. & E. Klein	Gewöhnlich-Kohlröschen
Orchidaceae	Pseudorchis albida (L.) A. & D. Löve	Stumpfsporn-Weißzüngel
Orbanthaceae	Bartsia alpina L.	Alpenhelm
Orbanthaceae	Euphrasia minima Jacq. ex DC.	Zwerg-Augentrost
Orbanthaceae	Euphrasia officinalis ssp. picta	Bunter Wiesen-Augentrost
Orbanthaceae	Euphrasia officinalis ssp. rostkoviana (Hayne) Towns.	Gewöhnlicher Wiesen-Augentrost
Orbanthaceae	Euphrasia salisburgensis Funck ex Hoppe	Salzburg-Augentrost
Orbanthaceae	Melampyrum sylvaticum L.	Berg-Wachtelweizen
Orbanthaceae	Pedicularis aspleniifolia Floerke ex Willd.	Farnblatt-Läusekraut
Orbanthaceae	Pedicularis palustris L.	Sumpf-Läusekraut
Orbanthaceae	Pedicularis recutita L.	Stutz-Läusekraut
Orbanthaceae	Pedicularis rostratocapitata Cr.	Kopf-Läusekraut
Orbanthaceae	Pedicularis tuberosa L.	Knollen-Läusekraut
Orbanthaceae	Rhinanthus alectorolophus Pollich	Zotten-Klappertopf
Orbanthaceae	Rhinanthus glacialis Personn.	Grannen-Klappertopf
Orbanthaceae	Rhinanthus minor L.	Klein-Klappertopf
Oxalidaceae	Oxalis acetosella L.	Wald-Sauerklee
Parnassiaceae	Parnassia palustris L.	Herzblatt
Pinaceae	Larix decidua Mill.	Europa-Lärche
Pinaceae	Picea abies (L.) Karsten	Gewöhnlich-Fichte
Pinaceae	Pinus cembra L.	Zirbe
Pinaceae	Pinus mugo Turra	Leg-Föhre
Pinaceae	Pinus sylvestris L.	Rot-Föhre
Plantaginaceae	Plantago lanceolata L.	Spitz-Wegerich
Plantaginaceae	Plantago major L. ssp. major	Gewöhnlicher Groß-Wegerich
Plantaginaceae	Plantago media L.	Mittel-Wegerich
Poaceae	Agrostis agrostiflora (Beck) Rauschert	Schilf-Straußgras
Poaceae	Agrostis alpina Scop.	Alpen-Straußgras
Poaceae	Agrostis capillaris L.	Rot-Straußgras
Poaceae	Agrostis rupestris All.	Felsen-Straußgras
Poaceae	Agrostis stolonifera L.	Kriech-Straußgras
Poaceae	Alopecurus pratensis L.	Wiesen-Fuchsschwanzgras
Poaceae	Anthoxanthum alpinum A. & D. Löve	Alpen-Ruchgras
Poaceae	Anthoxanthum odoratum L.	Wiesen-Ruchgras
Poaceae	Arrhenatherum elatius (L.) J. & K. Presl	Glatthafer
Poaceae	Avenella flexuosa (L.) Parl.	Drahtschmiele
Poaceae	Avena versicolor (Vill.) Lainz	Bunthafer
Poaceae	Briza media L.	Mittel-Zittergras

Familie	Taxa (Blütenpflanze und Farne)	Deutscher Name
Poaceae	<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Hall. f.) Koel.	Ufer-Reitgras
Poaceae	<i>Calamagrostis varia</i> (Schrad.) Host	Bunt-Reitgras
Poaceae	<i>Calamagrostis villosa</i> (Chaix) J. F. Gmel.	Woll-Reitgras
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Wiesen-Knäuelgras
Poaceae	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.	Horst-Rasenschmiele
Poaceae	<i>Elymus caninus</i> (L.) L.	Hunds-Quecke
Poaceae	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Acker-Quecke
Poaceae	<i>Festuca alpina</i> Suter	Alpen-Schwingel
Poaceae	<i>Festuca apennina</i>	Apenninen-Wiesen-Schwingel
Poaceae	<i>Festuca halleri</i> All.	Eigentlicher Felsen-Schwingel
Poaceae	<i>Festuca intercedens</i> (Hackel) Lüdi ex Becherer	Mittlerer Felsen-Schwingel
Poaceae	<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	Horst-Rot-Schwingel
Poaceae	<i>Festuca norica</i> (Hackel) K. Richter	Norischer Violett-Schwingel
Poaceae	<i>Festuca paniculata</i> (L.) Schinz & Thell.	Gold-Schwingel
Poaceae	<i>Festuca picturata</i> Pils	Bunter Violett-Schwingel
Poaceae	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Eigentlicher Wiesen-Schwingel
Poaceae	<i>Festuca pseudodura</i> Steud.	Harter Felsen-Schwingel
Poaceae	<i>Festuca pulchella</i> Schrad. ssp. <i>pulchella</i>	Eigentlicher Zier-Schön-Schwingel
Poaceae	<i>Festuca pumila</i> Chaix	Zwerg-Schwingel
Poaceae	<i>Festuca rubra</i> L.	Ausläufer-Rot-Schwingel
Poaceae	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.	Eigentlicher Furchen-Schwingel
Poaceae	<i>Festuca stenantha</i> (Hackel) K. Richter	Schmalrispen-Felsen-Schwingel
Poaceae	<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Falt-Schwadengras
Poaceae	<i>Homalotrichon pubescens</i> (Huds.) Dumort. ssp. <i>laevigatum</i>	Kahler Flaumhafer
Poaceae	<i>Hordeum jubatum</i> L.	Mähnen-Gerste
Poaceae	<i>Lolium perenne</i> L.	Dauer-Lolch
Poaceae	<i>Melica nutans</i> L.	Nickend-Perlgras
Poaceae	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Klein-Pfeifengras
Poaceae	<i>Nardus stricta</i> L.	Bürstling
Poaceae	<i>Oreochloa disticha</i> (Wulfen) Link	Kopfgras
Poaceae	<i>Phleum commutatum</i> Gaudin	Raugrannen-Alpen-Lieschgras
Poaceae	<i>Phleum hirsutum</i> Honck.	Matten-Lieschgras
Poaceae	<i>Phleum pratense</i> L.	Wiesen-Lieschgras
Poaceae	<i>Phleum rhaeticum</i> (C. J. Humpfr.) Rauschert	Wimpergrannen-Alpen-Lieschgras
Poaceae	<i>Poa alpina</i> L.	Alpen-Rispe
Poaceae	<i>Poa annua</i> L.	Einjahrs-Rispe
Poaceae	<i>Poa hybrida</i> Gaudin	Groß-Rispe
Poaceae	<i>Poa molinerii</i>	Innenalpen-Rispe
Poaceae	<i>Poa nemoralis</i> L.	Hain-Rispe
Poaceae	<i>Poa pratensis</i> L.	Wiesen-Rispe
Poaceae	<i>Poa supina</i> Schrad.	Läger-Rispe
Poaceae	<i>Poa trivialis</i> L.	Graben-Rispe
Poaceae	<i>Puccinellia distans</i> (L.) Parl.	Ruderal-Salzschwaden
Poaceae	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	Kalk-Blaugras
Poaceae	<i>Trisetum distichophyllum</i> (Vill.) P. Beauv.	Fächer-Goldhafer
Poaceae	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	Wiesen-Goldhafer
Poaceae	<i>Trisetum spicatum</i> (L.) K. Richter ssp. <i>ovatipaniculatum</i> Hulten	Eirispiger Ähren-Goldhafer
Polygalaceae	<i>Polygala alpestris</i> Rchb.	Alpen-Kreuzblume
Polygalaceae	<i>Polygala chamaebuxus</i> L.	Buchs-Kreuzblume
Polygonaceae	<i>Oxyria digyna</i> (L.) Hill	Säuerling
Polygonaceae	<i>Persicaria vivipara</i> (L.) Ronse Decr.	Knöllchen-Knöterich
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Gewöhnlich-Vogelknöterich
Polygonaceae	<i>Rumex acetosa</i> L.	Wiesen-Sauerampfer
Polygonaceae	<i>Rumex alpestris</i> Jacq.	Berg-Sauerampfer
Polygonaceae	<i>Rumex alpinus</i> L.	Alpen-Ampfer
Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Stumpfbblatt-Ampfer
Polygonaceae	<i>Rumex scutatus</i> L.	Schild-Sauerampfer
Polypodiaceae	<i>Polypodium vulgare</i> L.	Gewöhnlich-Tüpfelfarn
Portulacaceae	<i>Montia fontana</i> L.	Brunnen-Quellkraut
Potamogeto-	<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	Alpen-Laichkraut
Primulaceae	<i>Androsace obtusifolia</i> All.	Stumpfbblatt-Mannschild
Primulaceae	<i>Primula farinosa</i> L.	Mehl-Primel
Primulaceae	<i>Primula glutinosa</i> Jacq.	Kleb-Primel
Primulaceae	<i>Primula minima</i> L.	Zwerg-Primel
Primulaceae	<i>Soldanella alpina</i> L.	Alpen-Soldanelle
Primulaceae	<i>Soldanella pusilla</i> ssp. <i>alpicola</i>	Zwerg-Soldanelle
Ranunculaceae	<i>Aconitum lycoctonum</i> ssp. <i>lycoctonum</i>	Eigentlicher Wolfs-Eisenhut
Ranunculaceae	<i>Aconitum tauricum</i> Wulfen	Tauern-Eisenhut
Ranunculaceae	<i>Aconitum variegatum</i> L.	Bunt-Eisenhut
Ranunculaceae	<i>Anemone baldensis</i> L.	Baldo-Windröschen
Ranunculaceae	<i>Caltha palustris</i> L.	Sumpfdotterblume
Ranunculaceae	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre	Alpen-Küchenschelle
Ranunculaceae	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre ssp. <i>alba</i>	Österreichische Alpen-Küchenschelle
Ranunculaceae	<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	Frühlings-Küchenschelle
Ranunculaceae	<i>Ranunculus acris</i> L. ssp. <i>acris</i>	Gewöhnlicher Scharf-Hahnenfuß
Ranunculaceae	<i>Ranunculus alpestris</i> L.	Alpen-Hahnenfuß

Familie	Taxa (Blütenpflanze und Farne)	Deutscher Name
Ranunculaceae	Ranunculus glacialis L.	Gletscher-Hahnenfuß
Ranunculaceae	Ranunculus montanus Willd.	Berg-Hahnenfuß
Ranunculaceae	Ranunculus nemorosus DC.	Wald-Hahnenfuß
Ranunculaceae	Ranunculus repens L.	Kriech-Hahnenfuß
Ranunculaceae	Thalictrum minus L.	Klein-Wiesenraute
Ranunculaceae	Trollius europaeus L.	Europa-Trollblume
Rosaceae	Alchemilla alpina L. agg.	Sammelart Alpen-Silbermantel
Rosaceae	Alchemilla fissa Günth. & Schumm.	Schlitzblatt-Frauenmantel
Rosaceae	Alchemilla glabra Neygenf.	Kahl-Frauenmantel
Rosaceae	Alchemilla vulgaris L. agg.	Sammelart Gewöhnlich-Frauenmantel
Rosaceae	Cotoneaster integerrimus Medik.	Gewöhnlich-Steinmispel
Rosaceae	Dryas octopetala L.	Silberwurz
Rosaceae	Filipendula ulmaria (L.) Maxim	Groß-Mädesüß
Rosaceae	Fragaria vesca L.	Wald-Erdbeere
Rosaceae	Geum montanum L.	Berg-Nelkenwurz
Rosaceae	Geum rivale L.	Bach-Nelkenwurz
Rosaceae	Geum urbanum L.	Echt-Nelkenwurz
Rosaceae	Potentilla anserina L.	Gänse-Fingerkraut
Rosaceae	Potentilla aurea L.	Gold-Fingerkraut
Rosaceae	Potentilla crantzii (Cr.) Beck ex Fritsch	Crantz-Fingerkraut
Rosaceae	Potentilla erecta (L.) Rauschel	Blutwurz
Rosaceae	Potentilla pusilla Host	Flaum-Frühlings-Fingerkraut
Rosaceae	Prunus padus L.	Echt-Traubenkirsche
Rosaceae	Rosa pendulina L.	Hängefrucht-Rose
Rosaceae	Rubus idaeus L.	Echte Himbeere
Rosaceae	Sibbaldia procumbens L.	Gelbling
Rosaceae	Sorbus aucuparia L. ssp. aucuparia	Gewöhnliche Eberesche
Rubiaceae	Galium album Mill.	Großes Wiesen-Labkraut
Rubiaceae	Galium anisophyllum Vill.	Alpen-Labkraut
Rubiaceae	Galium palustre L.	Eigentliches Sumpf-Labkraut
Rubiaceae	Galium uliginosum L.	Moor-Labkraut
Ruscaceae	Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt	Zweiblatt-Schattenblümchen
Ruscaceae	Polygonatum verticillatum (L.) All.	Quirl-Weißwurz
Salicaceae	Populus tremula L.	Zitter-Pappel
Salicaceae	Salix alba L.	Silber-Weide
Salicaceae	Salix appendiculata Vill.	Großblatt-Weide
Salicaceae	Salix breviserrata Flod.	Kurzzahn-Weide
Salicaceae	Salix daphnoides Vill.	Reif-Weide
Salicaceae	Salix eleagnos Scop.	Lavendel-Weide
Salicaceae	Salix eleagnos x myrsinifolia	Hybride Lavendel- mit Schwarz-Weide
Salicaceae	Salix foetida Schleich ex DC.	Ruch-Weide
Salicaceae	Salix hastata L.	Spieß-Weide
Salicaceae	Salix helvetica Vill.	Schweizer Weide
Salicaceae	Salix helvetica x waldsteiniana	Hybride Schweizer mit Bäumchen-Weide
Salicaceae	Salix herbacea L.	Kraut-Weide
Salicaceae	Salix mielichhoferi Saut.	Tauern-Weide
Salicaceae	Salix myrsinifolia Salisb.	Schwarz-Weide
Salicaceae	Salix myrsinifolia x purpurea	Hybride Schwarz- mit Purpur-Weide
Salicaceae	Salix purpurea L.	Purpur-Weide
Salicaceae	Salix reticulata L.	Netz-Weide
Salicaceae	Salix retusa L.	Stumpfblatt-Weide
Salicaceae	Salix serpyllifolia Scop.	Quendelblättrige Teppich-Weide
Salicaceae	Salix waldsteiniana Willd.	Bäumchen-Weide
Sambucaceae	Sambucus nigra L.	Schwarz-Holunder
Sambucaceae	Sambucus racemosa L.	Rot-Holunder
Santalaceae	Thesium alpinum L.	Alpen-Leinblatt
Santalaceae	Thesium pyrenaicum Pourr.	Wiesen-Leinblatt
Sapindaceae	Acer pseudoplatanus L.	Berg-Ahorn
Saxifragaceae	Saxifraga adscendens L.	Aufsteige-Steinbrech
Saxifragaceae	Saxifraga aizoides L.	Bach-Steinbrech
Saxifragaceae	Saxifraga androsacea L.	Mannschild-Steinbrech
Saxifragaceae	Saxifraga biflora All.	Zweiblüten-Steinbrech
Saxifragaceae	Saxifraga biflora x oppositifolia	Hybride Zweiblüten- mit Gegenblatt-Steinbrech
Saxifragaceae	Saxifraga bryoides L.	Moos-Steinbrech
Saxifragaceae	Saxifraga caesia L.	Blaugrün-Steinbrech
Saxifragaceae	Saxifraga moschata Wulfen	Moschus-Steinbrech
Saxifragaceae	Saxifraga oppositifolia L.	Gegenblatt-Steinbrech
Saxifragaceae	Saxifraga paniculata Mill.	Rispen-Steinbrech
Saxifragaceae	Saxifraga stellaris L.	Stern-Steinbrech
Scrophulariaceae	Verbascum densiflorum Bertol.	Großblüten-Königskerze
Scrophulariaceae	Verbascum lychitis L.	Heide-Königskerze
Selaginellaceae	Selaginella selaginoides (L.) P. Beauv. ex Schrank & Mart.	Alpen-Moosfarn
Tamaricaceae	Myricaria germanica (L.) Desv.	Deutsche Ufertamariske
Thelypteridaceae	Phegopteris connectilis (Michx.) Watt	Buchenfarn
Thymelaeaceae	Daphne mezereum L.	Echt-Seidelbast
Thymelaeaceae	Daphne striata Tratt.	Streifen-Steinröschen

Familie	Taxa (Blütenpflanze und Farne)	Deutscher Name
Tofieldiaceae	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.	Kelch-Simsenlilie
Tofieldiaceae	<i>Tofieldia pusilla</i> (Michx.) Pers.	Zwerg-Simsenlilie
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	Groß-Brennnessel
Valerianaceae	<i>Valeriana montana</i> L.	Berg-Baldrian
Valerianaceae	<i>Valeriana saxatilis</i> L.	Felsen-Baldrian
Valerianaceae	<i>Valeriana officinalis</i> ssp. <i>officinalis</i>	Breitblatt-Arznei-Baldrian
Valerianaceae	<i>Valeriana officinalis</i> ssp. <i>tenuifolia</i>	Schmalblatt-Arznei-Baldrian
Veronicaceae	<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	Groß-Fingerhut
Veronicaceae	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	Alpen-Leinkraut
Veronicaceae	<i>Veronica alpina</i> L.	Alpen-Ehrenpreis
Veronicaceae	<i>Veronica aphylla</i> L.	Nackstiel-Ehrenpreis
Veronicaceae	<i>Veronica beccabunga</i> L.	Bach-Ehrenpreis
Veronicaceae	<i>Veronica bellidiodes</i> L.	Gänseblümchen-Ehrenpreis
Veronicaceae	<i>Veronica fruticans</i> Jacq.	Felsen-Ehrenpreis
Veronicaceae	<i>Veronica officinalis</i> L.	Echt-Ehrenpreis
Veronicaceae	<i>Veronica serpyllifolia</i> L. ssp. <i>humifusa</i> Syme	Gebirgs-Quendel-Ehrenpreis
Violaceae	<i>Viola biflora</i> L.	Zweiblüten-Veilchen
Violaceae	<i>Viola palustris</i> L.	Sumpf-Veilchen

Schmetterlinge

Patrick Gros

Nachgewiesene Taxa: 249 (255) – siehe Tab. 1

Dokumentierte Einzelnachweise: 1.213

Expert/-innen: Czadek Otmar, Benedikt Eva, Busse Annika, Deutsch Helmut, Eigner Marko, Eigner Anett, Geiblinger Walter, Gläser Jörg, Gros Patrick, Koren Toni, Lenhof Vanessa, Zadavec Mladen, Keller Rudi, Fleischmann Peter, Franz Raimund, Manke Nancy, Mayrhofer Roland, Meindl Hedwig, Neumayer Johann, Nowotny Günther, Rupp Thomas, Oertel Anke, Ortner Siegfried, Schattaneck Petra, Schmidt Annika, Schwuhchow André, Stangelmaier Günter, Stöhr Oliver, Vilgut Harald, Vilgut Manuel, Wiesmair Benjamin, Wittmann Helmut, Zinner Friederike

Trotz des regnerischen Wetters zeichneten sich besonders tagaktive Schmetterlinge während des Tages der Artenvielfalt 2017 mit hohen Artenanzahlen aus. Die sehr extensive Bewirtschaftung der Almen des Defereggental: Sanfte Beweidung (Magerweiden), späte, zeitlich gestaffelte Mahd (Bergmäher) ermöglichen eine hohe Artenvielfalt. So konnten bei recht heftigem Regen etwa 50 (!) tagfliegende Schmetterlingsarten am 15. Juli nachgewiesen werden, die auf Blüten und Kräuter sitzend auf Sonnenfenster warteten. Das ist absolut bemerkenswert, bedenkt man, dass auf herkömmlichen Wiesen heutzutage auch bei Schönwetter kaum ein Schmetterling zu sehen ist!

Bei nächtlichen Untersuchungen konnten mithilfe von Leuchtgeräten einige nachtaktiven Falterarten beobachtet werden: Besonders bemerkenswert war dabei der Nachweis der Habichtskraut-Silbereule *Autographa aemula* (Familie der Eulenfalter – Noctuidae) im Schwarzachtal: Es handelt sich um den ersten Nachweis dieser Art in Osttirol (DEUTSCH 2017)! Die Habichtskraut-Silbereule kommt in Europa nur in den Alpen und den Pyrenäen vor, wo sie eher frischfeuchte Fluren der subalpinen Stufe besiedelt.

Abbildung 21: Die Habichtskraut-Silbereule *Autographa aemula* wurde im Rahmen des Tages der Artenvielfalt im Defereggental beobachtet: Es handelt sich um den ersten Nachweis dieser Art in Osttirol! (Bild: http://www.rodeland.de/fotos/lepidoptera/20080725/lf_16_noctuidae.jpg).

Weiters war es möglich, ein Weibchen des Moränenzünslers *Catharia simplonialis* im hinteren Schwarzachtal fotografisch zu dokumentieren: Das ist ein sehr interessanter Nachweis eines augenfälligen Falters aus der Familie der

Zünsler (Crambidae), von dem es in Osttirol nur wenige alte Funde gibt. Die Art bewohnt ausschließlich die Gletschervorfelder und ist auf diese Lebensräume spezialisiert.

Auch der Engadiner Bär *Arctia flavia* (Familie der Scheineulenfalter – Erebidae), eine sehr lokal vorkommende und prächtige alpine Art, war ein bemerkenswerter Nachweis. Der exotisch anmutende, große und bunte Falter scheint in alpinen Lebensräumen wie fehl am Platz; vielfach weckte er aufgrund seiner Seltenheit die Begierde früherer Entomologen!

Abbildung 22: Der Engadiner Bär (*Arctia flavia*), eine der schönsten alpinen Schmetterlingsarten, wurde im Rahmen der Tage der Artenvielfalt im Nationalpark Hohe Tauern bereits mehrfach nachgewiesen. Auch im Defereggental ließ er sich von Lichtfallen anlocken (Foto: Patrick Gros).

Erwähnenswert ist auch die Beobachtung der alpinen Form des EU-geschützten Goldenen Scheckenfalters (*Euphydryas aurinia* – Familie der Edelfalter, Nymphalidae), der im Defereggental allerdings bereits vereinzelt nachgewiesen wurde. Über die Ökologie und die Biologie dieses alpinen Taxon ist trotz des besonderen Schutzes immer noch viel zu wenig bekannt.

Eine weitere EU-geschützte Tagfalterart, die auch nachgewiesen werden konnte, ist der Thymian-Ameisenbläuling (*Phengaris arion* – Familie der Bläulinge, Lycaenidae), der in den mageren Anteilen von Weideflächen anzutreffen ist. Er bevorzugt die steinreichen, flachgründigen Bereiche, wo Thymian-Arten, Futterpflanzen der Raupen, an sonnigen Stellen gedeihen. Werden zu viele der auf alpinen Magerweiden oft zahlreich liegenden Steine entfernt, werden günstige Reproduktionshabitate seltener. Werden die Lebensräume gedüngt, findet der Falter keine geeignete Fortpflanzungsbedingungen mehr: So ist er auch in Österreich in vielen Tallagen und im Alpenvorland bereits größtenteils ausgestorben.

Abbildung 23: Der Goldene Scheckenfalter (*Euphydryas aurinia*) ist eine EU-geschützte Art. Auch er konnte im Rahmen des Tages der Artenvielfalt im Defereggental nachgewiesen werden (Foto: Patrick Gros).

Abbildung 24: Der Thymian-Ameisenbläuling (*Phengaris arion*) ist auch eine EU-geschützte Art, die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt im Defereggental nachgewiesen wurde (Foto: Patrick Gros).

Abbildung 25: Der Geißblatt-Scheckenfalter (*Euphydryas intermedia*) kommt europaweit nur in den Alpen und dem Ural vor. In den Alpen ist er in der Regel sehr lokal anzutreffen, so dass Fundmeldungen recht spärlich sind. Er besiedelt die offenen Anteile des aufgelockerten Bergwalds und der erlen- und alpenrosenreichen Strauchzonen, wo die Raupen-Futterpflanze (Blaue Heckenkirsche – *Lonicera caerulea*) wächst. Auch er konnte 2017 im Defereggental nachgewiesen werden (Foto: Patrick Gros).

Abbildung 26: Schmetterlinge sind zum größten Teil nachtaktiv. Sie lassen sich von UV-reichem Licht anlocken. Diese Eigenschaft machen sich Forscher mit speziellen „Leuchtzelten“ zunutze (Foto: Solvin Zankl).

Tabelle 7: Nachweise von Schmetterlingen, die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert, die Familien nach drei Artengruppen: „Großschmetterlinge: Tagfalter“, „Großschmetterlinge: Nachtfalter“ und „Kleinschmetterlinge“.

Familie	Taxa (Schmetterlinge)	Deutscher Name
Großschmetterlinge: Tagfalter		
Hesperiidae	<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	Gelbwürliger Dickkopffalter
Hesperiidae	<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758)	Komma-Dickkopffalter
Hesperiidae	<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	Rostfarbiger Dickkopffalter
Hesperiidae	<i>Pyrgus alveus</i> (Hübner, 1803)	Sonnenröschen-Würfeldickkopffalter
Hesperiidae	<i>Pyrgus cacaliae</i> (Rambur, 1839)	Alpen-Würl-Dickkopffalter
Hesperiidae	<i>Pyrgus serratulae</i> (Rambur, 1839)	Rundfleckiger Würl-Dickkopffalter
Hesperiidae	<i>Pyrgus warrenensis</i> (Verity, 1928)	Alpiner Sonnenröschen-Würl-Dickkopffalter
Hesperiidae	<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter
Lycaenidae	<i>Agriades optilete</i> (Knoch, 1781)	Hochmoor-Bläuling
Lycaenidae	<i>Agriades orbitulus</i> (de Prunner, 1798)	Heller Alpen-Bläuling
Lycaenidae	<i>Aricia artaxerxes</i> (Fabricius, 1793)	Großer Sonnenröschen-Bläuling
Lycaenidae	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	Zwerg-Bläuling
Lycaenidae	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Rotklee-Bläuling
Lycaenidae	<i>Eumedonia eumedon</i> (Esper, 1780)	Storchschnabel-Bläuling
Lycaenidae	<i>Lycaena tityrus subalpina</i> (Speyer, 1851)	Brauner Feuerfalter
Lycaenidae	<i>Lycaena virgaureae</i> (Linnaeus, 1758)	Dukaten-Feuerfalter
Lycaenidae	<i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761)	Silbergrüner Bläuling
Lycaenidae	<i>Maculinea arion</i> (Linnaeus, 1758)	Thymian-Ameisen-Bläuling
Lycaenidae	<i>Polyommatus eros</i> (Ochsenheimer, 1808)	Eros-Bläuling
Nymphalidae	<i>Aglais io</i> (Linnaeus, 1758)	Tagpfauenauge
Nymphalidae	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	Kleiner Fuchs
Nymphalidae	<i>Argynnis aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	Großer Perlmutterfalter
Nymphalidae	<i>Boloria euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)	Früher Perlmutterfalter
Nymphalidae	<i>Boloria napaea</i> (Hoffmannsegg, 1804)	Großer Hochalpen-Perlmutterfalter
Nymphalidae	<i>Boloria pales</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hochalpen-Perlmutterfalter
Nymphalidae	<i>Boloria selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Sumpfwiesen-Perlmutterfalter
Nymphalidae	<i>Coenonympha gardetta</i> (de Prunner, 1798)	Alpen-Wiesenvögelchen
Nymphalidae	<i>Erebia alberganus</i> (de Prunner, 1798)	Mandeläugiger Mohrenfalter
Nymphalidae	<i>Erebia cassioides</i> (Reiner & Hochenwarth, 1792)	Schillernder Mohrenfalter
Nymphalidae	<i>Erebia epiphron</i> (Knoch, 1783)	Knochs Mohrenfalter
Nymphalidae	<i>Erebia eriphyle</i> (Freyer, 1836)	Ähnlicher Mohrenfalter
Nymphalidae	<i>Erebia euryale</i> (Esper, 1805)	Weißbindiger Bergwald-Mohrenfalter
Nymphalidae	<i>Erebia ligea</i> (Linnaeus, 1758)	Weißbindiger Mohrenfalter
Nymphalidae	<i>Erebia manto</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Gelbflecker Mohrenfalter
Nymphalidae	<i>Erebia medusa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Früher Mohrenfalter
Nymphalidae	<i>Erebia melampus</i> (Fuessly, 1775)	Kleiner Mohrenfalter
Nymphalidae	<i>Erebia nivalis</i> Lorkovic & De Lesse, 1954	Großglockner-Mohrenfalter
Nymphalidae	<i>Erebia pandrose</i> (Borkhausen, 1788)	Früher Alpen-Mohrenfalter
Nymphalidae	<i>Erebia pharte</i> (Hübner, 1804)	Unpunktierter Mohrenfalter
Nymphalidae	<i>Erebia pronoe</i> (Esper, 1780)	Quellen-Mohrenfalter
Nymphalidae	<i>Euphydryas aurinia glaciogenita</i> (Verity, 1928)	Goldener Scheckenfalter
Nymphalidae	<i>Euphydryas Cynthia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Alpen-Scheckenfalter
Nymphalidae	<i>Euphydryas intermedia</i> (Ménétriés, 1859)	Geißblatt-Scheckenfalter
Nymphalidae	<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	Braunauge
Nymphalidae	<i>Melitaea asteria</i> Freyer, 1828	Ostalpiner Scheckenfalter
Nymphalidae	<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	Wachtelweizen-Scheckenfalter
Nymphalidae	<i>Oeneis glacialis</i> (Moll, 1783)	Gletscherfalter
Nymphalidae	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Distelfalter
Papilionidae	<i>Parnassius phoebus</i> (Fabricius, 1793)	Hochalpenapollo
Pieridae	<i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1761)	Hochmoor-Gelbling
Pieridae	<i>Colias phicomone</i> (Esper, 1780)	Alpen-Gelbling
Pieridae	<i>Pieris bryoniae</i> (Hübner, 1806)	Berg-Weißling
Pieridae	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Kleiner Kohlweißling
Pieridae	<i>Pontia callidice</i> (Hübner, 1800)	Hochalpen-Weißling
Großschmetterlinge: Nachtfalter		
Erebidae	<i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758)	Brauner Bär
Erebidae	<i>Arctia flavia</i> (Fuessly, 1779)	Gelber Bär
Erebidae	<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)	Löwenzahnär
Erebidae	<i>Eilema cereola</i> (Hübner, 1803)	
Erebidae	<i>Eilema lurideola</i> (Zincken, 1817)	Grauleib-Flechtenärchen
Erebidae	<i>Hypena proboscidalis</i> (Linnaeus, 1758)	Nessel-Schnabeleule
Erebidae	<i>Parasemia plantaginis</i> (Linnaeus, 1758)	Wegerichär
Erebidae	<i>Scoliopteryx libatrix</i> (Linnaeus, 1758)	Zackeneule
Erebidae	<i>Setina irrorella</i> (Linnaeus, 1758)	Stein-Flechtenärchen
Erebidae	<i>Setina roscida</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Felsen-Flechtenärchen
Erebidae	<i>Spilosoma lubricipeda</i> (Linnaeus, 1758)	Minzenär
Geometridae	<i>Alcis repandata</i> (Linnaeus, 1758)	
Geometridae	<i>Aplocera praeformata</i> (Hübner, 1826)	
Geometridae	<i>Biston betularia</i> (Linnaeus, 1758)	Birkenspanner
Geometridae	<i>Cabera exanthemata</i> (Scopoli, 1763)	

Familie	Taxa (Schmetterlinge)	Deutscher Name
Geometridae	<i>Cabera pusaria</i> (Linnaeus, 1758)	
Geometridae	<i>Campaea margaritaria</i> (Linnaeus, 1761)	
Geometridae	<i>Charissa ambiguata</i> (Duponchel, 1830)	
Geometridae	<i>Charissa glaucinaria</i> (Hübner, 1799)	
Geometridae	<i>Coenoteiphria salicata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Geometridae	<i>Colostygia aptata</i> (Hübner, 1813)	
Geometridae	<i>Colostygia aqueata</i> (Hübner, 1813)	
Geometridae	<i>Colostygia olivata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Geometridae	<i>Colostygia turbata</i> (Hübner, 1799)	
Geometridae	<i>Dysstroma citrata</i> (Linnaeus, 1761)	
Geometridae	<i>Dysstroma truncata</i> (Hufnagel, 1767)	
Geometridae	<i>Ecliptopera capitata</i> (Herrich-Schäffer, 1839)	
Geometridae	<i>Ecliptopera silaceata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Geometridae	<i>Elophos dilucidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Geometridae	<i>Elophos serotinaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Geometridae	<i>Elophos vittaria</i> (Thunberg, 1788)	
Geometridae	<i>Entephria caesiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Geometridae	<i>Entephria cyanata</i> (Hübner, 1809)	
Geometridae	<i>Entephria flavinctata</i> (Hübner, 1813)	Steinbrech-Gebirgsblattspanner
Geometridae	<i>Epirrhoe galiata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Geometridae	<i>Epirrhoe molluginata</i> (Hübner, 1813)	
Geometridae	<i>Epirrhoe tristata</i> (Linnaeus, 1758)	
Geometridae	<i>Eupithecia icterata</i> (de Villers, 1789)	
Geometridae	<i>Eupithecia lariciata</i> (Freyer, 1841)	
Geometridae	<i>Eupithecia pusillata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Geometridae	<i>Eupithecia semigraphata</i> Bruand, 1850	
Geometridae	<i>Eupithecia subfuscata</i> (Haworth, 1809)	
Geometridae	<i>Eupithecia venosata</i> (Fabricius, 1787)	
Geometridae	<i>Glacies alpinata</i> (Scopoli, 1763)	
Geometridae	<i>Glacies coracina</i> (Esper, 1805)	
Geometridae	<i>Gnophos obfuscata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Geometridae	<i>Horisme tersata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Geometridae	<i>Hydriomena furcata</i> (Thunberg, 1784)	
Geometridae	<i>Hydriomena impluviata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Geometridae	<i>Hylaea fasciaria</i> (Linnaeus, 1758)	
Geometridae	<i>Hypomecis punctinalis</i> (Scopoli, 1763)	
Geometridae	<i>Lomaspiis marginata</i> (Linnaeus, 1758)	Vogelschmeiß-Spanner
Geometridae	<i>Lycia alpina</i> (Sulzer, 1776)	
Geometridae	<i>Macaria brunneata</i> (Thunberg, 1784)	Waldmoorspanner
Geometridae	<i>Macaria fusca</i> (Thunberg, 1792)	
Geometridae	<i>Mesoleuca albicillata</i> (Linnaeus, 1758)	
Geometridae	<i>Mesotype verberata</i> (Scopoli, 1763)	
Geometridae	<i>Odezia atrata</i> (Linnaeus, 1758)	
Geometridae	<i>Peribatodes rhomboidaria</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Geometridae	<i>Perizoma albulata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Geometridae	<i>Perizoma hydrata</i> (Treitschke, 1829)	
Geometridae	<i>Perizoma minorata</i> (Treitschke, 1828)	
Geometridae	<i>Perizoma verberata</i> (Scopoli, 1763)	
Geometridae	<i>Rheumaptera hastata</i> (Linnaeus, 1758)	
Geometridae	<i>Scopula immutata</i> (Linnaeus, 1758)	
Geometridae	<i>Scopula incanata</i> (Linnaeus, 1758)	
Geometridae	<i>Scopula ternata</i> Schrank, 1802	
Geometridae	<i>Scotopteryx chenopodiata</i> (Linnaeus, 1758)	
Geometridae	<i>Selenia dentaria</i> (Fabricius, 1775)	
Geometridae	<i>Thera britannica</i> (Turner, 1925)	
Geometridae	<i>Thera cembrae</i> (Kitt, 1912)	
Geometridae	<i>Thera cognata</i> (Thunberg, 1792)	
Geometridae	<i>Thera variata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Geometridae	<i>Venusia cambrica</i> Curtis, 1839	
Geometridae	<i>Xanthorhoe decoloraria</i> (Esper, 1806)	
Geometridae	<i>Xanthorhoe montanata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Lasiocampidae	<i>Eriogaster arbusculae</i> Freyer, 1849	Alpen-Wollflatter
Lasiocampidae	<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Eichenspinner
Lasiocampidae	<i>Trichiura crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Weißdornspinner
Noctuidae	<i>Abrostola asclepiadis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Schwalbenwurz-Höckereule
Noctuidae	<i>Acronicta auricoma</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Goldhaar-Rindeneule
Noctuidae	<i>Acronicta euphorbiae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Wolfsmilch-Rindeneule
Noctuidae	<i>Agrotis clavus</i> (Hufnagel, 1766)	Magewiesen-Bodeneule
Noctuidae	<i>Agrotis exclamationis</i> (Linnaeus, 1758)	Graseule
Noctuidae	<i>Agrotis segetum</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Saateule
Noctuidae	<i>Amphipyra tragopoginis</i> (Clerck, 1759)	Dreipunkt-Glanzeule
Noctuidae	<i>Anaplectoides prasina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Grüne Heidelbeereule
Noctuidae	<i>Apamea crenata</i> (Hufnagel, 1766)	Große Veränderliche Grasbüscheleule
Noctuidae	<i>Apamea furva</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Trockenrasen-Grasbüscheleule
Noctuidae	<i>Apamea illyria</i> Freyer, 1846	Zweifarbige Grasbüscheleule
Noctuidae	<i>Apamea lateritia</i> (Hufnagel, 1766)	Ziegelrote Grasbüscheleule

Familie	Taxa (Schmetterlinge)	Deutscher Name
Noctuidae	<i>Apamea maillardi</i> (Geyer, 1834)	
Noctuidae	<i>Apamea monoglypha</i> (Hufnagel, 1766)	Große Grasbüscheleule
Noctuidae	<i>Apamea remissa</i> (Hübner, 1809)	Klein Veränderliche Grasbüscheleule
Noctuidae	<i>Apamea rubrivena</i> (Treitschke, 1825)	Schwarzweiße Grasbüscheleule
Noctuidae	<i>Apamea sublustris</i> (Esper, 1788)	Rötlichgelbe Grasbüscheleule
Noctuidae	<i>Apamea zeta</i> (Treitschke, 1825)	
Noctuidae	<i>Autographa aemula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Noctuidae	<i>Autographa bractea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Silberblatt-Goldeule
Noctuidae	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma-Eule
Noctuidae	<i>Autographa pulchrina</i> (Haworth, 1809)	Ziest-Silbereule
Noctuidae	<i>Caradrina morpheus</i> (Hufnagel, 1766)	Morpheus-Stabeule
Noctuidae	<i>Ceramica pisi</i> (Linnaeus, 1758)	
Noctuidae	<i>Cerapteryx graminis</i> (Linnaeus, 1758)	Dreizack-Graseule
Noctuidae	<i>Chersotis cuprea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Kupfereule
Noctuidae	<i>Chersotis ocellina</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Noctuidae	<i>Craniophora ligustri</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Liguster-Rindeneule
Noctuidae	<i>Cucullia lucifuga</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Kräuter-Mönch
Noctuidae	<i>Diachrysa chrysitis</i> (Linnaeus, 1758)	Messingeule
Noctuidae	<i>Diarsia brunnea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Braune Erdeule
Noctuidae	<i>Diarsia dahlia</i> (Hübner, 1813)	Moorwiesen-Erdeule
Noctuidae	<i>Diarsia mendica</i> (Fabricius, 1775)	Primel-Erdeule
Noctuidae	<i>Diarsia rubi</i> (Vieweg, 1790)	Rötliche Erdeule
Noctuidae	<i>Epipsilia griseocens</i> (Fabricius, 1794)	Bergwiesen-Bodeneule
Noctuidae	<i>Euchalcia variabilis</i> (Piller, 1783)	Eisenhut-Höckereule
Noctuidae	<i>Eurois occulta</i> (Linnaeus, 1758)	Graue Heidelbeereule
Noctuidae	<i>Euxoa decora</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Hellgraue Erdeule
Noctuidae	<i>Graphiphora augur</i> (Fabricius, 1775)	Augur-Bodeneule
Noctuidae	<i>Hada plebeja</i> (Linnaeus, 1761)	Zahneule
Noctuidae	<i>Hadena caesia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Noctuidae	<i>Hadena confusa</i> (Hufnagel, 1766)	Marmorierte Nelkeneule
Noctuidae	<i>Hoplodrina octogenaria</i> (Goeze, 1781)	Gelbbraune Staubeule
Noctuidae	<i>Hoplodrina respersa</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Graue Felsflur-Staubeule
Noctuidae	<i>Hyppa rectilinea</i> (Esper, 1788)	Heidelbeer-Stricheule
Noctuidae	<i>Lacanobia thalassina</i> (Hufnagel, 1766)	Schwarzstrich-Kräutereule
Noctuidae	<i>Lasionhada proxima</i> (Hübner, 1809)	
Noctuidae	<i>Lateroligia ophiogramma</i> (Esper, 1794)	
Noctuidae	<i>Leucania comma</i> (Linnaeus, 1761)	
Noctuidae	<i>Mniotype adusta</i> (Esper, 1790)	
Noctuidae	<i>Mythimna andereggii</i> (Boisduval, 1840)	
Noctuidae	<i>Mythimna conigera</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Weißfleck-Graseule
Noctuidae	<i>Mythimna ferrago</i> (Fabricius, 1787)	Kapuzen-Graseule
Noctuidae	<i>Mythimna impura</i> (Hübner, 1808)	Stumpfflügel-Graseule
Noctuidae	<i>Noctua fimbriata</i> (Schreber, 1759)	Bunte Bandeule
Noctuidae	<i>Noctua pronuba</i> (Linnaeus, 1758)	Hausmutter
Noctuidae	<i>Oligia latruncula</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Dunkles Halmeulchen
Noctuidae	<i>Oligia versicolor</i> (Borkhausen, 1792)	Buntes Halmeulchen
Noctuidae	<i>Pachetra sagittigera</i> (Hufnagel, 1766)	Trockenrasen-Blättereule
Noctuidae	<i>Papestra biren</i> (Goeze, 1781)	Moorwald-Blättereule
Noctuidae	<i>Polia bombycina</i> (Hufnagel, 1766)	Hauhechel-Blättereule
Noctuidae	<i>Sideridis reticulata</i> (Goeze, 1781)	Netzeule
Noctuidae	<i>Sideridis rivularis</i> (Fabricius, 1775)	Violettbraune Kapseleule
Noctuidae	<i>Xestia baja</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Baja-Bodeneule
Noctuidae	<i>Xestia collina</i> (Boisduval, 1840)	Mittelgebirgs-Bodeneule
Noctuidae	<i>Xestia rhaetica</i> (Staudinger, 1871)	
Noctuidae	<i>Xestia speciosa</i> (Hübner, 1813)	Bergwald-Bodeneule
Nolidae	<i>Pseudoiops prasinana</i> (Linnaeus, 1758)	Buchen-Kahneule
Notodontidae	<i>Cerura vinula</i> (Linnaeus, 1758)	Großer Gabelschwanz
Notodontidae	<i>Pheosia gnoma</i> (Fabricius, 1776)	Birken-Zahnspinner
Notodontidae	<i>Pheosia tremula</i> (Clerck, 1759)	Porzellanspinner
Notodontidae	<i>Pterostoma palpina</i> (Clerck, 1759)	Schnauzenspinner
Notodontidae	<i>Ptilodon capucina</i> (Linnaeus, 1758)	Kamel-Zahnspinner
Kleinschmetterlinge		
Acrolepiidae	<i>Digitivalva arnicella</i> (Heyden, 1863)	
Adelidae	<i>Nematopogon swammerdamella</i> (Linnaeus, 1758)	
Choreutidae	<i>Tebenna bjerkanrella</i> (Thunberg, 1784)	
Crambidae	<i>Agriphila straminella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Crambidae	<i>Catharia simplonialis</i> (Heydenreich, 1851)	
Crambidae	<i>Catoptria conchella</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Crambidae	<i>Catoptria furcatellus</i> (Zetterstedt, 1839)	
Crambidae	<i>Catoptria petrificella</i> (Hübner, 1796)	
Crambidae	<i>Chrysoteuchia culmella</i> (Linnaeus, 1758)	
Crambidae	<i>Crambus lathoniellus</i> (Zincken, 1817)	
Crambidae	<i>Crambus perlella</i> (Scopoli, 1763)	Weißer Graszünsler
Crambidae	<i>Crambus pratella</i> (Linnaeus, 1758)	
Crambidae	<i>Eudonia murana</i> (Curtis, 1827)	
Crambidae	<i>Eudonia sudetica</i> (Zeller, 1839)	

Familie	Taxa (Schmetterlinge)	Deutscher Name
Crambidae	Nomophila noctuella (Denis & Schiffermüller, 1775)	Wanderzünsler
Crambidae	Pyrausta aerealis (Hübner, 1793)	
Crambidae	Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)	
Crambidae	Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Crambidae	Udea alpinalis (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Crambidae	Udea nebulalis (Hübner, 1796)	
Crambidae	Udea uliginosalis (Stephens, 1834)	
Gelechiidae	Teleopsis bagriotella (Duponchel, 1840)	
Glyphipterigidae	Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781)	
Hepialidae	Hepialus humuli (Linnaeus, 1758)	Großer Hopfen-Wurzelbohrer
Momphidae	Mompha conturbatella (Hübner, 1819)	
Oecophoridae	Denisia similella (Hübner, 1796)	
Oecophoridae	Denisia stroemella (Fabricius, 1779)	
Pterophoridae	Oidaematophorus rogenhoferi (Mann, 1871)	
Pterophoridae	Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)	
Pterophoridae	Stenoptilia coprodactylus (Stainton, 1851)	
Pyalidae	Matilella fusca (Haworth, 1811)	
Tineidae	Myrmecozela ochraceella (Tengström, 1848)	
Tortricidae	Celypha cespitana (Hübner, 1817)	
Tortricidae	Clepsis steineriana (Hübner, 1799)	
Tortricidae	Cnephasia alticolana (Herrich-Schäffer, 1851)	
Tortricidae	Eana argentana (Clerck, 1759)	
Tortricidae	Eana osseana (Scopoli, 1763)	
Tortricidae	Epinotia tedella (Clerck, 1759)	
Tortricidae	Paramesia gnomana (Clerck, 1759)	
Zygaenidae	Adscita geryon (Hübner, 1813)	Sonnenröschen-Grünwiderchen
Zygaenidae	Zygaena exulans (Hohenwarth, 1792)	Alpen-Widerchen

Hautflügler

Johann Neumayer, Martin Schlager, Thomas Rupp und Walter Wallner

Nachgewiesene Taxa: 20

Dokumentierte Einzelnachweise: 187

Expert/-innen: Ambros Aichhorn, Elisabeth Koder, Johann Neumayer, Thomas Rupp, Martin Schlager, Walter Wallner

Johann Neumayer, Martin Schlager, Thomas Rupp und Walter Wallner nutzten den Tag der Artenvielfalt des Nationalparks Hohe Tauern, um die Hummeln vor allem der Lagen über der Waldgrenze zu erfassen. Dazu untersuchten sie schon am 14.07. einen Höhengradienten von 1.550 bis 2.600m (Barmer Hütte). Der geplante Hauptuntersuchungstag am 15.07. fiel leider Schlechtwetter mit Schneetreiben zum Opfer. Dafür wurde der Abstieg zum Staller Sattel für einen weiteren Höhengradienten genutzt.

Insgesamt konnten 218 Hummelindividuen in 13 Arten festgestellt werden. Die hochalpine Hummelfauna war mit Ausnahme von *Bombus alpinus* vollständig vertreten. Das Fehlen dieser Art im Untersuchungsgebiet ist ein weiteres Indiz, dass diese am meisten an hochalpine Regionen angepasste Art in den Ostalpen ausschließlich am Alpenhauptkamm vorkommt. Von den Arten der subalpinen und alpinen Stufe fehlten einige wenige seltenere Arten. Ambros Aichhorn konnte vier zusätzliche Arten nachweisen, so dass insgesamt 17 Hummelarten bestimmt werden konnten.

Aus älteren Datensätzen sind aus dem Gemeindegebiet von St. Jakob in Deferegggen zusätzlich noch weitere acht Hummelarten nachgewiesen: *Bombus bohemicus*, *B. hypnorum*, *B. lucorum*, *B. mesomelas*, *B. monticola*, *B. quadricolor*, *B. sylvarum* und *B. sylvestris*. Die 25 bekannt gewordenen Hummelarten des Gemeindegebiets von St. Jakob in Deferegggen repräsentieren 58% der in Österreich aktuell vorkommenden 43 Hummelarten.

Weiters konnten von Johann Neumayer et al. noch drei weitere Wildbienenarten in der alpinen Höhenstufe nachgewiesen werden.

In tieferen Lagen ist mit einer weit höheren Anzahl an Bienenarten zu rechnen, doch ist der Kenntnisstand diesbezüglich noch sehr rudimentär.

Ambros Aichhorn fand drei Nester von *B. sichelii* und 1 Nest von *B. cryptarum* auf den frisch gemähten Wiesen der Jagdhausalmen. Er stellte fest, dass diese Kolonien wohl infolge der nasskalten Witterung extrem schwach waren. Im unteren Bereich auf 1.586 m Höhe beobachtete er bereits mehr Arbeiterinnen als Königinnen. Auf den Jagdhausalmen sah er erst eine einzige Arbeiterin.

Abbildung 27: Die Heide-Erdhummel *Bombus cryptarum* wurde bis über 2.600m nachgewiesen (Foto: Johann Neumayer).

Tabelle 8: Nachweise von Hautflüglern, die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Hautflügler)	Deutscher Name
Apidae	<i>Bombus cryptarum</i> (Fabricius, 1775)	Kryptarum-Erdhummel
Apidae	<i>Bombus gerstaeckeri</i> Morawitz, 1881	Eisenhuthummel
Apidae	<i>Bombus hortorum</i> (Linnaeus, 1761)	Gartenhummel
Apidae	<i>Bombus humilis</i> Illiger, 1806	Veränderliche Hummel
Apidae	<i>Bombus lapidarius</i> (Linnaeus, 1758)	Steinhummel
Apidae	<i>Bombus mendax</i> Gerstaecker, 1869	Trughummel
Apidae	<i>Bombus monticola</i> Smith, 1849	Berglandhummel
Apidae	<i>Bombus mucidus</i> (Gerstaecker, 1869)	Grauweiße Hummel
Apidae	<i>Bombus pascuorum</i> (floralis Gmelin, 1790)	Ackerhummel
Apidae	<i>Bombus pratensis</i> (Linnaeus, 1761)	Wiesenhummel
Apidae	<i>Bombus pyrenaicus</i> Perez, 1879	Pyrenäenhummel
Apidae	<i>Bombus ruderarius</i> (Müller, 1776)	Grashummel
Apidae	<i>Bombus rufus</i> (Fabricius, 1793)	Felsenkuckuckshummel
Apidae	<i>Bombus sichelii</i> Radoszkowski, 1859	Höhenhummel
Apidae	<i>Bombus soroeensis</i> (Fabricius, 1777)	Distelhummel
Apidae	<i>Bombus veteranus</i> (Fabricius, 1793)	Sandhummel
Apidae	<i>Bombus wurflenii</i> Radoszkowski, 1859	Bergwaldhummel
Apidae	<i>Dufourea alpina</i> (Morawitz 1865)	Glanzbiene
Apidae	<i>Hylaeus nivalis</i> (Morawitz 1867)	Maskenbiene
Apidae	<i>Lasioglossum alpicolum</i> (Dalla Torre 1877)	Schmalbiene

Heuschrecken

Helmut Wittmann

Nachgewiesene Taxa: 9 (12) – siehe Tab. 1

Dokumentierte Einzelnachweise: 72

Expert/-innen: Falco Eigner, Marko Eigner, Patrick Gros, Inge Illich, Michael Jung, Günther Nowotny, Anke Oertel, Helmut Wittmann, Friederike Zinner

In dem von Orthopterologen untersuchten Gebiet am Tag der Artenvielfalt, das ist im Wesentlichen das hintere Schwarzwachtal und das bei den Jagdhausalmen abzweigende Affental sowie die dazwischen liegenden Abhänge des Hörnle wurden insgesamt 12 Heuschreckenarten nachgewiesen. Es handelt sich dabei um 10 Kurzfühlerschrecken (Caelifera) und 2 Langfühlerschrecken (Ensifera). Bedingt durch die Höhenlage im subalpin-alpinen Bereich ist das Artenspektrum bereits etwas eingeschränkt. Die großflächigen, zum Teil südexponierten, meist nur extensiv beweideten alpinen Rasen bieten jedoch einen außerordentlich guten Heuschrecken-Lebensraum. Auch die reiche Gliederung der Rasen durch Felswände, kleinräumige Schuttfluren und Einzelfelsen macht den Untersuchungsraum für eine Reihe von Heuschrecken besonders interessant.

Abbildung 28: Die Nordische Gebirgsschrecke (*Melanoplus frigidus*) ist eine sehr variabel gefärbte Heuschreckenart, die im Untersuchungsgebiet bemerkenswert häufig nachgewiesen wurde (Foto: Helmut Wittmann).

Bemerkenswert im Gebiet ist das fast „häufige“ Auftreten der Nordischen Gebirgsschrecke (*Melanoplus frigidus*, Abb. 26), eine Art, die in Österreich auf Habitate oberhalb der Waldgrenze beschränkt ist. So liegen sämtliche Nachweise in Österreich (ILLICH 2017) oberhalb von 1900 m Seehöhe, am häufigsten ist die Art im österreichischen Bundesgebiet in Seehöhen zwischen 2200 und 2300 m. Wie bei ILLICH (2017) ausgeführt wird, ist der Hauptlebens-

raum der Nordischen Gebirgsschrecke nicht oder kaum beweidete alpine Rasen, aber auch flechtenreiche Windkantengesellschaften werden gerne genutzt. Trotz der Höhenlage und der oftmaligen Exponiertheit des Lebensraumes benötigt *Melanoplus frigidus* zumindest vorübergehend hohe Sonneneinstrahlungen, ein Trend zu thermisch begünstigten Südlagen ist erkennbar. Die Nordische Gebirgsschrecke weist in Österreich nur eine vergleichsweise geringe Rasterfrequenz auf, das Areal erstreckt sich von Vorarlberg bis in das nordwestliche Kärnten. Das österreichische Verbreitungsbild bei ILLICH (2017) zeigt gehäufte Vorkommen in einzelnen Gebirgsregionen und dazwischen liegende Gebiete, in denen die Art fehlt oder bisher nicht nachgewiesen wurde. Die große Häufigkeit der Nordischen Gebirgsschrecke im Untersuchungsgebiet zeigt sich in Abb. 27, aus der hervorgeht, dass die südexponierten Hänge im Umfeld des Hörnle (nördlich der Jagdhausalmen) mehr oder weniger flächig von den Tallagen bis in die höchsten Höhen von dieser Art besiedelt werden.

Abbildung 29: Verteilung der lokalen Nachweise von *Melanoplus frigidus* im Untersuchungsgebiet (rote Punkte) (Quelle: Biodiversitätsdatenbank – Haus der Natur).

Ein weiterer bemerkenswerter Nachweis ist der Bunte Alpengrashüpfer (*Stenobothrus rubicundulus*, Abb. 28). Der Bunte Alpengrashüpfer macht seinem Namen alle Ehre, seine „Buntheit“ wird vor allem durch die dunkelbraunen Flügeldecken, das leuchtend rote Abdomenende und die ebenfalls rot-orange gefärbten Hinterbeine mit schwarzen „Knien“ sowie die grün gefärbte Kopf- und Brustregion hervorgerufen. An schönen Tagen fällt die Art darüber hinaus durch ihr auffälliges Flügelschnarren auf, das sie insbesondere beim Flug „unüberhörbar“ macht. Auch *Stenobothrus rubicundulus* ist in Österreich hauptsächlich südlich des Alpenhauptkammes verbreitet (LANDMANN 2017), wobei jedoch einzelne Vorkommen in den Nördlichen Kalkalpen und in der Thermenlinie westlich von Wien existieren. Im Untersuchungsgebiet wurde die Art nur in den grasigen und zwergstrauchdurchsetzten westexponierten Abhängen des Schwarzachtals südöstlich der Jagdhausalmen nachgewiesen.

Eine andere äußerst attraktive Heuschreckenart, die in den österreichischen Gebirgsregionen jedoch weiter verbreitet ist, ist die Gewöhnliche Gebirgsschrecke (*Podisma pedestris*, Abb. 29, 30). Vor allem an der Südabdachung des Alpenhauptkammes, aber auch in den Nördlichen Kalkalpen kommt diese Art verbreitet vor, an der Nordabdachung der Hohen Tauern fehlt sie in weiten Gebieten völlig (FORSTHUBER 2017). Im Projektgebiet wurde *Podisma pedestris* zweimal und zwar südöstlich und nordnordwestlich der Jagdhausalmen festgestellt.

Abbildung 30: *Stenobothrus rubicundulus* ist eine der buntesten Heuschrecken im Alpenraum, die darüber hinaus noch durch ihr auffällig schnarrendes Fluggeräusch auffällt (Foto: Helmut Wittmann).

Abbildung 31: Weibchen der Gewöhnlichen Gebirgsschrecke (*Podisma pedestris*) (Foto: Helmut Wittmann).

Abbildung 32: Männchen der Gewöhnlichen Gebirgsschrecke (*Podisma pedestris*) (Foto: Helmut Wittmann).

Tabelle 9: Nachweise von Heuschrecken, die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Ordnung	Familie	Taxa (Libellen, Käfer)	Deutscher Name
Heuschrecken	Acrididae	<i>Bohemanella frigida</i> (Boheman, 1846)	Nordische Gebirgsschrecke
Heuschrecken	Acrididae	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	Nachtigall-Grashüpfer
Heuschrecken	Acrididae	<i>Chorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)	Sumpfgrashüpfer
Heuschrecken	Acrididae	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Gemeiner Grashüpfer
Heuschrecken	Acrididae	<i>Gomphocerus sibiricus</i> (Linnaeus, 1767)	Sibirische Keulenheuschrecke
Heuschrecken	Acrididae	<i>Omocestus viridulus</i> (Linnaeus, 1758)	Bunter Grashüpfer
Heuschrecken	Acrididae	<i>Podisma pedestris</i> (Linnaeus, 1758)	Gewöhnliche Gebirgsschrecke
Heuschrecken	Acrididae	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	Heidegrashüpfer
Heuschrecken	Acrididae	<i>Stenobothrus rubicundulus</i> Kruseman & Jeekel, 1967	Bunter Alpengrashüpfer
Heuschrecken	Tetrigidae	<i>Tetrix bipunctata bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Zweipunkt-Dornschröcke
Heuschrecken	Tettigoniidae	<i>Decticus verrucivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Gemeiner Warzenbeisser
Heuschrecken	Tettigoniidae	<i>Tettigonia cantans</i> (Fuessli, 1775)	Zwitscherschröcke

Käfer

Patrick Gros

Nachgewiesene Taxa: 68

Dokumentierte Einzelnachweise: 132

Expert/-innen: Reik Böckelmann, Andreas Eckelt, Manfred Kahlen, Friederike Zinner

Im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 wurden Käfer in folgenden Untersuchungsgebieten erhoben: Oberhausalm, Patschertal, Klammloch und Arvental.

Insgesamt wurden 132 Nachweise von 68 Taxa dokumentiert.

Abbildung 33: Fabricius' Laufkäfer (*Carabus fabricii*, links) und der Alpen-Laufkäfer (*Carabus alpestris*, rechts) wurden im Rahmen des Tages der Artenvielfalt im Defereggental nachgewiesen (Fotos: Andreas Eckelt).

Tabelle 9: Nachweise von Käfern, die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Ordnung	Familie	Taxa (Käfer)	Deutscher Name
Käfer	Anobiidae	<i>Ptinus fur</i> (Linnaeus, 1758)	
Käfer	Byrrhidae	<i>Byrrhus gigas</i> Fabricius, 1787	
Käfer	Byrrhidae	<i>Cytilus sericeus</i> (Forster, 1771)	
Käfer	Cantharidae	<i>Cantharis tristis</i> Fabricius, 1797	
Käfer	Cantharidae	<i>Rhagonycha maculicollis</i> Maerkel, 1852	
Käfer	Carabidae	<i>Amara erratica</i> (Duftschmid, 1812)	Gebirgs-Kamelläufer
Käfer	Carabidae	<i>Amara praetermissa</i> (C. R. Sahlberg, 1827)	Verkannter Kamelläufer
Käfer	Carabidae	<i>Amara quenseli</i> (Schönherr, 1806)	Quensels Kamelläufer
Käfer	Carabidae	<i>Bembidion cruciatum</i> Dejean, 1831	
Käfer	Carabidae	<i>Bembidion glaciale</i> Heer, 1840	Gletscher-Ahlenläufer
Käfer	Carabidae	<i>Calathus melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	Schwarzköpfiger Breithalsläufer
Käfer	Carabidae	<i>Calathus micropterus</i> (Duftschmid, 1812)	Kleiner Kahläufer
Käfer	Carabidae	<i>Carabus alpestris hoppii</i> Germar, 1824	Alpen-Laufkäfer
Käfer	Carabidae	<i>Carabus fabricii</i> Duftschmid, 1812	
Käfer	Carabidae	<i>Cicindela campestris</i> Linnaeus, 1758	Feld-Sandlaufkäfer
Käfer	Carabidae	<i>Cicindela gallica</i> Brullé, 1834	
Käfer	Carabidae	<i>Cychrus caraboides</i> (Linnaeus, 1758)	Gewöhnlicher Schaufelläufer

Ordnung	Familie	Taxa (Käfer)	Deutscher Name
Käfer	Carabidae	<i>Cymindis vaporariorum</i> (Linnaeus, 1758)	Rauchbrauner Nachtläufer
Käfer	Carabidae	<i>Leistus nitidus</i> (Duftschmid, 1812)	Grünlänzender Bartläufer
Käfer	Carabidae	<i>Nebria hellwigii hellwigii</i> (Panzer, 1797)	
Käfer	Carabidae	<i>Nebria jockischii jockischii</i> Sturm, 1815	
Käfer	Carabidae	<i>Nebria rufescens</i> (Stroem, 1768)	Bergbach-Dammläufer
Käfer	Carabidae	<i>Notiophilus biguttatus</i> (Fabricius, 1779)	Zweifleckiger Strandläufer
Käfer	Carabidae	<i>Oreonebria castanea</i> (Bonelli, 1810)	
Käfer	Carabidae	<i>Pterostichus jurinei</i> (Panzer, 1803)	Jurines Grabläufer
Käfer	Carabidae	<i>Pterostichus unctulatus</i> (Duftschmid, 1812)	Bergstreu-Grabläufer
Käfer	Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus hypochaeridis</i> (Linnaeus, 1758)	
Käfer	Chrysomelidae	<i>Gonioctena nivosa</i> (Suffrian, 1851)	
Käfer	Chrysomelidae	<i>Oreina frigida</i> (Weise, 1883)	
Käfer	Chrysomelidae	<i>Oreina speciosissima speciosissima</i> (Scopoli, 1763)	
Käfer	Cryptophagidae	<i>Cryptophagus badius</i> Sturm, 1845	
Käfer	Curculionidae	<i>Dryocoetes autographus</i> (Ratzeburg, 1837)	
Käfer	Curculionidae	<i>Hylurgops glabratus</i> (Zetterstedt, 1828)	
Käfer	Curculionidae	<i>Larinus sturnus</i> (Schaller, 1873)	Schallers Distelrüssler
Käfer	Curculionidae	<i>Otiorhynchus alpicola</i> Boheman, 1843	Variabler Dickmaulrüssler
Käfer	Curculionidae	<i>Otiorhynchus auricomus</i> Germar, 1824	Alpenweiden-Dickmaulrüssler
Käfer	Curculionidae	<i>Otiorhynchus nodosus</i> (O. F. Müller, 1764)	Knotiger Dickmaulrüssler
Käfer	Curculionidae	<i>Pelenomus hygrophilus</i> (Hustache, 1923)	Steinbrech-Sumpfrüssler
Käfer	Dasytidae	<i>Dasytes alpigradus</i> Kiesenwetter, 1863	
Käfer	Elateridae	<i>Fleutiauxellus maritimus</i> (Curtis, 1840)	
Käfer	Elateridae	<i>Hypnoidus spec.</i>	
Käfer	Hydrophilidae	<i>Helophorus glacialis</i> Villa & Villa, 1833	Gletscher-Furchenwasserkäfer
Käfer	Leiodidae	<i>Agathidium arcticum</i> Thomson, 1862	
Käfer	Leiodidae	<i>Agathidium dentatum</i> Mulsant & Rey, 1861	
Käfer	Leiodidae	<i>Agathidium rotundatum</i> (Gyllenhal, 1827)	
Käfer	Monotomidae	<i>Rhizophagus dispar</i> (Paykull, 1800)	
Käfer	Pythidae	<i>Pytho depressus</i> Linnaeus, 1767	
Käfer	Staphylinidae	<i>Acidota crenata</i> (Fabricius, 1793)	
Käfer	Staphylinidae	<i>Acrulia inflata</i> (Gyllenhal, 1813)	
Käfer	Staphylinidae	<i>Anthophagus alpinus</i> (Paykull, 1790)	Alpen-Blütenräuber
Käfer	Staphylinidae	<i>Atheta fungivora</i> (Thomson, 1867)	
Käfer	Staphylinidae	<i>Bledius fontinalis</i> Bernhauer, 1929	
Käfer	Staphylinidae	<i>Eucnecosum brachypterum</i> (Gravenhorst, 1802)	
Käfer	Staphylinidae	<i>Eusphalerum alpinum</i> (Heer, 1839)	
Käfer	Staphylinidae	<i>Eusphalerum robustum</i> (Heer, 1839)	
Käfer	Staphylinidae	<i>Geodromicus kunzei</i> (Heer, 1839)	
Käfer	Staphylinidae	<i>Liogluta micans</i> (Mulsant & Rey, 1852)	
Käfer	Staphylinidae	<i>Mycetoporus maerkelii</i> Kraatz, 1857	
Käfer	Staphylinidae	<i>Ocypus brevipennis</i> (Heer, 1839)	
Käfer	Staphylinidae	<i>Omalium excavatum</i> Stephens, 1834	
Käfer	Staphylinidae	<i>Oxypoda annularis</i> Mannerheim, 1830	
Käfer	Staphylinidae	<i>Oxypoda skalitzkyi</i> Bernhauer, 1902	
Käfer	Staphylinidae	<i>Quedius haberfelneri</i> Eppelsheim, 1891	
Käfer	Staphylinidae	<i>Quedius plagiatus</i> Mannerheim, 1843	
Käfer	Staphylinidae	<i>Quedius punctatellus</i> (Heer, 1839)	Raubkäfer
Käfer	Staphylinidae	<i>Quedius unicolor</i> Kiesenwetter, 1847	
Käfer	Staphylinidae	<i>Xylodromus depressus</i> (Gravenhorst, 1802)	
Käfer	Staphylinidae	<i>Zoosetha rufescens</i> (Kraatz, 1856)	

Diverse Insekten (Libellen, Zweiflügler - Tipuloidea)

Patrick Gros

Nachgewiesene Taxa: 7

Dokumentierte Einzelnachweise: 7

Expert/-innen: Peter Vogtenhuber, Helmut Wittmann

Hier werden Insektengruppen zusammengefasst, für die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 verhältnismäßig wenige Meldungen erfolgten, was v. a. darauf beruht, dass diese Gruppen von Natur aus wenige Arten beinhalten. 2017 waren dies die Ordnung der Libellen (Odonata) und die Tipuloidea, eine Überfamilie aus der Organismengruppe der Mücken (Zweiflügler / Diptera).

Diese Insektengruppen wurden in der Umgebung der Oberhausalm, der Seebachalm und von St. Jakob untersucht.

Insgesamt wurden 7 Nachweise von 7 Arten dokumentiert.

Abbildung 34: Männchen der Speer-Azurjungfer (*Coenagrion hastulatum*) (Foto: Patrick Gros).

Tabelle 10: Nachweise von Libellen und Tipuloidea, die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Ordnung	Familie	Taxa (Libellen, Tipuloidea)	Deutscher Name
Libellen	Coenagrionidae	<i>Coenagrion hastulatum</i> (Charpentier, 1825)	Speer-Azurjungfer
Zweiflügler	Limoniidae	<i>Dicranophragma separatum</i> (Walker, 1848)	
Zweiflügler	Limoniidae	<i>Molophilus spec.</i>	
Zweiflügler	Limoniidae	<i>Orimarga attenuata</i> (Walker, 1848)	
Zweiflügler	Limoniidae	<i>Ormosia spec.</i>	
Zweiflügler	Limoniidae	<i>Tasiocera spec.</i>	
Zweiflügler	Tipulidae	<i>Tipula gorziensis</i> Strobl, 1893	

Spinnentiere

Patrick Gros

Nachgewiesene Taxa: 32

Dokumentierte Einzelnachweise: 54

Expert/-innen: Detlef Tolke

Im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 wurden Spinnentiere in folgenden Untersuchungsgebieten erhoben: Oberhausalm, Patschertal, Klammljoch und Arvental.

Insgesamt wurden 54 Nachweise von 32 Arten dokumentiert.

Abbildung 35: *Pardosa oreophila* wurde 2017 im Patschertal und oberhalb der Oberhausalm nachgewiesen (Foto: Alexander Rief).

Tabelle 11: Nachweise von Spinnentieren, die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Spinnentiere)	Deutscher Name
Agelenidae	Tegenaria silvestris L. Koch, 1872	Agelenidae
Araneidae	Aculepeira ceropegia Walckenaer, 1802	Araneidae
Araneidae	Araneus diadematus Clerck, 1758	Araneidae
Araneidae	Araneus quadratus Clerck, 1758	Araneidae
Araneidae	Parazygiella montana (Koch, 1834)	Araneidae
Clubionidae	Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863	Clubionidae
Cybaeidae	Cybaeus minor Chyzer, 1897	Cybaeidae
Dictynidae	Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758)	Dictynidae
Gnaphosidae	Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802)	Gnaphosidae
Gnaphosidae	Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839)	Gnaphosidae
Gnaphosidae	Zelotes similis (Kulczynski, 1887)	Gnaphosidae
Gnaphosidae	Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833)	Gnaphosidae
Linyphiidae	Agniphantes expunctus (O. P.-Cambridge, 1875)	Linyphiidae
Linyphiidae	Erigone tirolensis L. Koch, 1872	Linyphiidae
Linyphiidae	Hilaira montigena (L. Koch, 1872)	Linyphiidae
Linyphiidae	Mansuphantes fragilis (Thorell, 1875)	Linyphiidae
Linyphiidae	Oreonetides glacialis (L. Koch, 1872)	Linyphiidae
Lycosidae	Pardosa amentata (Clerck, 1758)	Lycosidae
Lycosidae	Pardosa blanda (C. L. Koch, 1833)	Lycosidae
Lycosidae	Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870)	Lycosidae
Lycosidae	Pardosa nigra (C. L. Koch, 1834)	Lycosidae
Lycosidae	Pardosa oreophila Simon, 1937	Lycosidae
Lycosidae	Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833)	Lycosidae

Familie	Taxa (Spinnentiere)	Deutscher Name
Lycosidae	<i>Pardosa saturator</i> Simon, 1937	Lycosidae
Philodromidae	<i>Philodromus cespitum</i> (Walckenaer, 1802)	Philodromidae
Philodromidae	<i>Philodromus vagulus</i> Simon, 1875	Philodromidae
Salticidae	<i>Sitticus floricola</i> (C. L. Koch, 1837)	Salticidae
Salticidae	<i>Sitticus rupicola</i> (C. L. Koch, 1837)	Salticidae
Tetragnathidae	<i>Metellina segmentata</i> (Clerck, 1758)	Tetragnathidae
Theridiidae	<i>Robertus truncorum</i> (L. Koch, 1872)	Theridiidae
Theridiidae	<i>Theridion petraeum</i> L. Koch, 1872	Theridiidae
Theridiidae	<i>Theridion sisypium</i> (Clerck, 1758)	Theridiidae

Amphibien, Reptilien, Fische und Weichtiere

Patrick Gros

Nachgewiesene Taxa: 6 (7) – siehe Tab. 1

Dokumentierte Einzelnachweise: 57

Expert/-innen: Marko Eigner, Patrick Gros, Patrick Jocher, Anke Oertel, Helmut Wittmann, Friederike Zinner

Im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 wurden Amphibien, Reptilien, Fische und Weichtiere in folgenden Untersuchungsgebieten erhoben: Umgebung der Patscheralm, Brugger Almbach, Obersee, Mariahilf, Seebachalm, Oberhausalm, Jagdhausalm, Schwarzachtal und Arvental.

Insgesamt wurden 57 Nachweise von 7 Arten dokumentiert.

Abbildung 36: Die Kreuzotter wird aus dem Nationalpark Hohe Tauern nicht häufig gemeldet: 2017 wurde sie im Rahmen des Tages der Artenvielfalt zwischen Seebach- und Oberhausalm mehrfach nachgewiesen (Foto: Martin Kyek).

Tabelle 12: Nachweise von Amphibien, Reptilien, Fischen und Weichtieren, die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Tiergruppe	Familie	Taxa (Amphibien, Reptilien und Fische)	Deutscher Name
Amphibien	Ranidae	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Grasfrosch
Reptilien	Anguillidae	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Blindschleiche
Reptilien	Lacertidae	<i>Zootoca vivipara</i> (Jacquin, 1787)	Bergeidechse, Waldeidechse
Reptilien	Viperidae	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Kreuzotter
Fische	Cottidae	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Koppe
Fische	Salmonidae	<i>Salmo trutta</i> Linnaeus 1758 f. <i>fario</i> L.	Bachforelle
Weichtiere	Helicidae	<i>Arianta arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)	Gefleckte Schnirkelschnecke

Vögel

Jakob Pöhacker

Nachgewiesene Taxa: 52 (60) – siehe Tab. 1

Dokumentierte Einzelnachweise: 428

Expert/-innen: Ambros Aichhorn, Gebhard Brenner, Matthias Bull, Elisabeth Koder, Margarethe Lanz, Christine Medicus, Reinhard Medicus, Günther Nowotny, Anke Oertel, Ralph Winkler, Helmut Wittmann

Im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 wurden die Vögel im Oberen Defereggental beinahe flächendeckend erhoben.

Insgesamt wurden 428 Nachweise von 62 Arten dokumentiert.

Besonders bemerkenswert waren die ersten eindeutigen Brutnachweise des Braunkehlchens im Gebiet der Jagdhausalmen und der Oberhausalm. Das nächstbekannte Osttiroler Vorkommen besteht im Talboden bei St. Jakob im Defereggental.

Beachtlich war auch die Sichtung des in den Hohen Tauern selten nachgewiesenen Zitronenzeisigs im Patschertal!

Abbildung 37: Adultes Männchen des Braunkehlchens (Foto: Frank Fichtmueller/Shutterstock.com).

Tabelle 13: Nachweise von Vögeln, die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Vögel)	Deutscher Name
Accipitridae	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Habicht
Accipitridae	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Sperber
Accipitridae	<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Steinadler
Accipitridae	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Mäusebussard
Accipitridae	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	Bartgeier
Apodidae	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Mauersegler
Certhiidae	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Waldbaumläufer
Columbidae	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Ringeltaube
Corvidae	<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Kolkrabe
Corvidae	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Eichelhäher
Corvidae	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	Tannenhäher
Corvidae	<i>Pyrrhocorax graculus</i> (Linnaeus, 1766)	Alpendohle
Cuculidae	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Kuckuck
Emberizidae	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Goldammer
Falconidae	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Baumfalke
Falconidae	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Turmfalke
Fringillidae	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Bluthänfling
Fringillidae	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Stieglitz
Fringillidae	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Grünfink
Fringillidae	<i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	Birkenzeisig
Fringillidae	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Erlenzeisig
Fringillidae	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Buchfink
Fringillidae	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Fichtenkreuzschnabel
Fringillidae	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Gimpel
Fringillidae	<i>Serinus citrinella</i> (Pallas, 1764 sensu lato)	Zitronenzeisig
Hirundinidae	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Mehlschwalbe
Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Rauchschwalbe
Hirundinidae	<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)	Felsenschwalbe
Motacillidae	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Bergpieper
Motacillidae	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Baumpieper
Motacillidae	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Bachstelze
Motacillidae	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Gebirgsstelze
Muscicapidae	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rotkehlchen
Muscicapidae	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Grauschnäpper
Muscicapidae	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Steinschmätzer
Muscicapidae	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Hausrotschwanz
Muscicapidae	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Braunkehlchen
Paridae	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Blaumeise
Paridae	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Kohlmeise
Paridae	<i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758)	Tannenmeise
Paridae	<i>Poecile montanus</i> (Conrad von Baldenstein, 1827)	Weidenmeise
Passeridae	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Hausperling
Phylloscopidae	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Zilpzalp
Picidae	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Buntspecht
Picidae	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Grünspecht
Prunellidae	<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	Alpenbraunelle
Prunellidae	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Heckenbraunelle
Regulidae	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Wintergoldhähnchen
Scolopacidae	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Flussuferläufer
Scolopacidae	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758	Waldwasserläufer
Sittidae	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Kleiber
Sittidae	<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758)	Mauerläufer
Sylviidae	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Mönchsgrasmücke
Sylviidae	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Gartengrasmücke
Sylviidae	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Klappergrasmücke
Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Zaunkönig
Turdidae	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Amsel
Turdidae	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Singdrossel
Turdidae	<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758	Ringdrossel
Turdidae	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Misteldrossel

Säugetiere

Patrick Gros

Nachgewiesene Taxa: 11

Dokumentierte Einzelnachweise: 57

Expert/-innen: Patrick Gros, Rudi Keller, Sonja Frischmann, Harald Mixanig, Günther Nowotny, Anke Oertel, Eberhardt Stüber, Helmut Wittmann

Im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 wurden Säugetiere in folgenden Untersuchungsgebieten erhoben: Umgebung der Seebachalm, der Oberhausalm, der Jagdhausalm, des Oberen Schwarzachtals und des Arventals.

Insgesamt wurden 57 Nachweise von 11 Arten dokumentiert.

Die wenigen Säugetierdaten sind einerseits Zufallsbeobachtungen verschiedener Teilnehmer/-innen. Andererseits wurden Säugetierarten von Sonja Frischmann und Harald Mixanig mittels Batcorder (Fledermausnachweise) nachgewiesen, von Eberhardt Stüber mittels Sherman-Fallen (diverser Mäusearten).

Abbildung 38: Ohne diese Säugetiere wäre keine traditionelle, naturnahe Bewirtschaftung des Defereggen-tals möglich... (Foto: Martin Kurzthaler).

Tabelle 14: Nachweise von Säugetieren, die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 dokumentiert wurden. Die Taxa sind alphabetisch nach Familien sortiert.

Familie	Taxa (Säugetiere)	Deutscher Name
Cervidae	<i>Capreolus capreolus</i> Linnaeus, 1758	Reh
Cricetidae	<i>Microtus subterraneus</i> de Sélys-Longchamps, 1836	Kurzohrmaus
Cricetidae	<i>Myodes glareolus</i> Schreber, 1780	Rötelmaus
Muridae	<i>Chionomys nivalis</i> Martins, 1842	Schneemaus
Sciuridae	<i>Marmota marmota</i> Linnaeus, 1758	Murmeltier
Soricidae	<i>Neomys anomalus</i> Cabrera, 1907	Sumpfspitzmaus
Soricidae	<i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758	Waldspitzmaus
Vespertilionidae	<i>Eptesicus nilssonii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Nordfledermaus
Vespertilionidae	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Fransenfledermaus
Vespertilionidae	<i>Myotis spec.</i>	Fledermaus (Myotis-Art unbestimmt)
Vespertilionidae	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Zwergfledermaus

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die blüten- und krautreiche Landschaft des Schwarzachtals bildet ein Eldorado für alpine Insekten (Foto: Patrick Gros)	1
Abbildung 2: Das gebiet der Jagdhausalm im unteren Arvental (Foto: NPHT)	2
Abbildung 3: Nationalpark Hohe Tauern Tag der Artenvielfalt 2017 – Hinteres Defereggental: Teilnehmende Expert/-innen – einzelne Expert/-innen mussten früher abreisen, und sind hier nicht abgebildet (Foto: Solvin Zankl). ...	5
Abbildung 4: Natürliche Berglandschaft aus dem Patschertal (Foto: Christine Medicus)	6
Abbildung 5: Lage der Fundorte (gelbe Punkte), die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt 2017 angelegt wurden (Grafik: Haus der Natur, Peter Kaufmann)	8
Abbildung 6: Die rosafarbenen Lamellen auf der Hut-Unterseite machen <i>Agaricus aristocratus</i> in Kombination mit seinem hochalpinen Habitat nahezu unverwechselbar (Schwarzachtal, Ostabhang des Hörndls, ca. 2.500 msm, 15.7.2017) (Foto: Helmut Wittmann)	10
Abbildung 7: <i>Entoloma sericatum</i> (Weiden-Rötling) (Foto: Till R. Lohmeyer & Ute Künkele)	11
Abbildung 8: <i>Cytidia salicina</i> (Roter Weiden-Schichtpilz) (Foto: Till R. Lohmeyer & Ute Künkele)	12
Abbildung 9: <i>Leccinum piceinum</i> (Fichten-Rotkappe) (Foto: Till R. Lohmeyer & Ute Künkele)	12
Abbildung 10: <i>Polycauliona candelaria</i> (Foto: Roman Türk)	16
Abbildung 11: <i>Letharia vulpina</i> (Foto: Roman Türk)	17
Abbildung 12: <i>Schistidium platyphyllum</i> im Oberen Defereggental - erster gesicherter Fund für Osttirol! (Foto: Wolfgang Hofbauer)	20
Abbildung 13: <i>Spirotaenia condensata</i> , eine besonders schöne Vertreterin der Jochalgen wurde im Arvental nachgewiesen (Foto: Anke Oertel)	24
Abbildung 14: Die Zweifarben Segge, eine typische Art alpiner Schwemmlandbiotope, besitzt naturschutzfachlich äußerst wertvolle Populationen im Schwarzach- und Arvental (Foto: Helmut Wittmann)	26
Abbildung 15: Die seltene Zweihäusig-Segge tritt mehrfach im Arven- und Schwarzachtal auf (Foto: Helmut Wittmann)	27
Abbildung 16: Die dunkel-purpurbraun gefärbten Spelzen mit ihrem breiten, weißen, oft fransig-gewimperten Hautrand machen die Heide-Segge unverwechselbar (Foto: Helmut Wittmann)	28
Abbildung 17: Die Berg-Flockenblume wurde erst wenige Male in Osttirol nachgewiesen (Foto: Helmut Wittmann)	29
Abbildung 18: An seiner eigenartigen Flügelung des Kelches kann man den Schlauch-Enzian leicht erkennen (Foto: Helmut Wittmann)	30
Abbildung 19: Auch der seltene Lappland-Spitzkiel wurde am Tag der Artenvielfalt im hinteren Schwarzachtal nachgewiesen (Foto: Helmut Wittmann)	31
Abbildung 20: Wulfens-Hauswurz mit ihrem aus gelben Einzelblüten zusammengesetztem, attraktiven Blütenstand (Foto: Helmut Wittmann)	32

Abbildung 21: Die Habichtskraut-Silbereule <i>Autographa aemula</i> wurde im Rahmen des Tages der Artenvielfalt im Defereggental beobachtet: Es handelt sich um den ersten Nachweis dieser Art in Osttirol! (Bild: http://www.rodeland.de/fotos/lepidoptera/20080725/lf_16_noctuidae.jpg).	41
Abbildung 22: Der Engadiner Bär (<i>Arctia flavia</i>), eine der schönsten alpinen Schmetterlingsarten, wurde im Rahmen der Tage der Artenvielfalt im Nationalpark Hohe Tauern bereits mehrfach nachgewiesen. Auch im Defereggental ließ er sich von Lichtfallen anlocken (Foto: Patrick Gros).	42
Abbildung 23: Der Goldene Scheckenfalter (<i>Euphydryas aurinia</i>) ist eine EU-geschützte Art. Auch er konnte im Rahmen des Tages der Artenvielfalt im Defereggental nachgewiesen werden (Foto: Patrick Gros).	43
Abbildung 24: Der Thymian-Ameisenbläuling (<i>Phengaris arion</i>) ist auch eine EU-geschützte Art, die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt im Defereggental nachgewiesen wurde (Foto: Patrick Gros).	43
Abbildung 25: Der Geißblatt-Scheckenfalter (<i>Euphydryas intermedia</i>) kommt europaweit nur in den Alpen und dem Ural vor. In den Alpen ist er in der Regel sehr lokal anzutreffen, so dass Fundmeldungen recht spärlich sind. Er besiedelt die offenen Anteile des aufgelockerten Bergwalds und der erlen- und alpenrosenreichen Strauchzonen, wo die Raupen-Futterpflanze (Blaue Heckenkirsche – <i>Lonicera caerulea</i>) wächst. Auch er konnte 2017 im Defereggental nachgewiesen werden (Foto: Patrick Gros).	44
Abbildung 26: Schmetterlinge sind zum größten Teil nachtaktiv. Sie lassen sich von UV-reichem Licht anlocken. Diese Eigenschaft machen sich Forscher mit speziellen „Leuchtzelten“ zunutze (Foto: Solvin Zankl).	44
Abbildung 27: Die Heide-Erdhummel <i>Bombus cryptarum</i> wurde bis über 2.600m nachgewiesen (Foto: Johann Neumayer).	50
Abbildung 28: Die Nordische Gebirgsschrecke (<i>Melanoplus frigidus</i>) ist eine sehr variabel gefärbte Heuschreckenart, die im Untersuchungsgebiet bemerkenswert häufig nachgewiesen wurde (Foto: Helmut Wittmann).	51
Abbildung 29: Verteilung der lokalen Nachweise von <i>Melanoplus frigidus</i> im Untersuchungsgebiet (rote Punkte) (Quelle: Biodiversitätsdatenbank – Haus der Natur).	52
Abbildung 30: <i>Stenobothrus rubicundulus</i> ist eine der buntesten Heuschrecken im Alpenraum, die darüber hinaus noch durch ihr auffällig schnarrendes Fluggeräusch auffällt (Foto: Helmut Wittmann).	53
Abbildung 31: Weibchen der Gewöhnlichen Gebirgsschrecke (<i>Podisma pedestris</i>) (Foto: Helmut Wittmann).	53
Abbildung 32: Männchen der Gewöhnlichen Gebirgsschrecke (<i>Podisma pedestris</i>) (Foto: Helmut Wittmann).	54
Abbildung 33: Fabricius' Laufkäfer (<i>Carabus fabricii</i> , links) und der Alpen-Laufkäfer (<i>Carabus alpestris</i> , rechts) wurden im Rahmen des Tages der Artenvielfalt im Defereggental nachgewiesen (Fotos: Andreas Eckelt).	55
Abbildung 34: Männchen der Speer-Azurjungfer (<i>Coenagrion hastulatum</i>) (Foto: Patrick Gros).	57
Abbildung 35: <i>Pardosa oreophila</i> wurde 2017 im Patschertal und oberhalb der Oberhausalm nachgewiesen (Foto: Alexander Rief).	58
Abbildung 36: Die Kreuzotter wird aus dem Nationalpark Hohe Tauern nicht häufig gemeldet: 2017 wurde sie im Rahmen des Tages der Artenvielfalt zwischen Seebach- und Oberhausalm mehrfach nachgewiesen (Foto: Martin Kyek).	60
Abbildung 37: Adultes Männchen des Braunkehlchens (Foto: Frank Fichtmueller/Shutterstock.com).	62
Abbildung 38: Ohne diese Säugetiere wäre keine traditionelle, naturnahe Bewirtschaftung des Defereggentals möglich... (Foto: Martin Kurzthaler).	64

Literatur- und Quellenverzeichnis

- ARMING C., H. AUGUSTIN, S. BRAMESHUBER, C. EICHBERGER, V. GFRERER, P. GROS, P. KAUFMANN, M. KYEK, R. LINDNER, A. MALETZKY, C. MEDICUS, R. PATZNER, R. SCHRATTENECKER-TRAVNITZKY, C. SCHRÖCK & H. WITTMANN** (2016): Analyse des bestehenden Natura-2000-Netzwerkes im Bundesland Salzburg, Österreich. - Gutachten erstellt im Rahmen des „Netzwerk:Natur-Salzburg“: 168 pp (URL.: http://www.hausdernatur.at/tl_files/download/10_Arbeitsgemeinschaften/o8_netzwerk_natur/n2000/N2000_NetzwerkNatur.pdf).
- BAUCH K., M. JUNGMEIER & S. LIEB** (2007): Forschungskonzept Nationalpark Hohe Tauern 2020. – Positionspapier des Nationalparks Hohe Tauern. http://www.hohetauern.at/dmdocuments/2008_Dateien/Forschung/Publikationen/20071001_forschungskonzept2020.pdf (10.02.2009)
- DÄMON W. & I. KRISAI-GREILHUBER** (2016): Die Pilze Österreichs, Verzeichnis und Rote Liste, Teil: Makromyzeten. – Herausgeber: Österr. Mykolog. Ges., Wien: 610 pp.
- DEUTSCH H.** (2017): Beitrag zur Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) Osttirols, Österreich – Teil VII: weitere Neufunde und selten nachgewiesene Arten. – Z. Arb. Gem. Öst. Ent. **69**: 77-89.
- DOBEŠ C. & E. VITEK** (2000): Dokumented Chromosome Number Checklist of Austrian Vascular Plants. – Museum of Natural History, Vienna: 642 pp.
- ELLIS L. T. et al.** (2019): New national and regional bryophyte records. – Journal of Bryology **59**: 1-18.
- ENGLMAIER P. & T. WILHALM** (2018): Alien grasses (Poaceae) in the flora of the Eastern Alps: Contribution to an excursion flora of Austria and the Eastern Alps. – Neilrechia - Zeitschrift für Pflanzensystematik und Floristik Österreichs **9**: 177-245.
- FISCHER M. A., K. OSWALD & W. ADLER** (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Auflage, Land Oberösterreich, Biologiezentrum der Oberösterr. Landesmuseen, Linz.
- FORSTHUBER L.** (2017): Gewöhnliche Gebirgsschrecke, *Podisma pedestris* (Linnaeus, 1758). – In: ZUNA-KRATKY T., A. LANDMANN, I. ILLICH, L. ZECHNER, F. ESSL, K. LECHNER, A. ORTNER, W. WEIßMAIR & G. WÖSS (2017): Die Heuschrecken Österreichs. – Denisia **39**: 539 - 543.
- GROS P., W. DÄMON & C. MEDICUS** (2007): Nationalpark Hohe Tauern - Tag der Artenvielfalt 2007 (Kaiser Dorfertal, Osttirol). – Bericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern. Haus der Natur, Salzburg: 1-66.
- GROS P., R. LINDNER & C. MEDICUS** (2009): Nationalpark Hohe Tauern - Tag der Artenvielfalt 2008 (Wildgerlostal, Salzburg). – Bericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern. Haus der Natur, Salzburg: 1-80.
- GROS P., R. LINDNER & C. MEDICUS** (2010): Nationalpark Hohe Tauern - Tag der Artenvielfalt 2009 (Dösental, Kärnten). – Bericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern. Haus der Natur, Salzburg: 1-98.
- GROS P., R. LINDNER & C. MEDICUS** (2012a): Nationalpark Hohe Tauern - Tag der Artenvielfalt 2011 (Glocknertäler, Osttirol). – Bericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern. Haus der Natur, Salzburg: 1-37.
- GROS P., LINDNER R., MEDICUS C., WITTMANN H., FOISSNER W., HEISS E., HIRSCHL ÄGER M., LOHMEYER T. R., NEUNER W., OERTEL A., PFLEGER H. S., PILSL P., STÖHR O., TAURER-ZEINER C. & R. TÜRK** (2012b): Nationalpark Hohe Tauern, Seidlwinkltal (Rauris, Salzburg) – GEO Tag der Artenvielfalt. – Abh. Zool.-Bot. Ges. Österreich **38**, 1–70.
- GROS P., R. LINDNER & H. WITTMANN** (2015): Nationalpark Hohe Tauern - Tag der Artenvielfalt 2012 (Hollersbachtal, Sbg.). – Bericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern. Haus der Natur, Salzburg: 1-44.
- GROS P.** (2016): Nationalpark Hohe Tauern - Tag der Artenvielfalt 2013 (Gschrösbachtal/Umbaltal, Osttirol). – Bericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern. Haus der Natur, Salzburg: 1-32.
- GROS P. & R. LINDNER** (2017a): Nationalpark Hohe Tauern - Tag der Artenvielfalt 2014 (Seebachtal, Kärnten). – Bericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern. Haus der Natur, Salzburg: 1-45.
- GROS P. & R. LINDNER** (2017b): Nationalpark Hohe Tauern - Tag der Artenvielfalt 2015 (Untersulzbachtal, Salzburg). – Bericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern. Haus der Natur, Salzburg: 1-43.

- GROS P. & R. LINDNER** (2018): Nationalpark Hohe Tauern - Tag der Artenvielfalt 2016 (Tauerntal, Kärnten). – Bericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern. Haus der Natur, Salzburg: 1-72.
- GULDEN G. & K. M. JENSSEN** (1988): Arctic and Alpine Fungi 2. – Soppkonsulenen, Oslo: 58 pp.
- GULDEN G. & L. TORKELSEN** (1996): *Agaricus aristocratus* sp. nov. – Nosk Polarinst. Skr. **198**: 179.
- ILLICH I.** (2017): Nordische Gebirgsschrecke, *Melanoplus frigidus* (Boheman, 1834). – In: ZUNA-KRATKY T., A. LANDMANN, I. ILLICH, L. ZECHNER, F. ESSL, K. LECHNER, A. ORTNER, W. WEIßMAIR & G. WÖSS (2017): Die Heuschrecken Österreichs. – *Denisia* **39**: 544 – 548.
- KLOFAC W.** (2007): – Österr. Zschr. f. Pilzk. **16**: 250.
- LANDMANN A.** (2017): Bunter Alpengrashüpfer, *Stenobothrus rubicundulus* (Kruseman & Jeekel, 1967). – In: ZUNA-KRATKY T., A. LANDMANN, I. ILLICH, L. ZECHNER, F. ESSL, K. LECHNER, A. ORTNER, W. WEIßMAIR & G. WÖSS (2017): Die Heuschrecken Österreichs. – *Denisia* **39**: 714 – 718.
- LEUTE G.-H.** (1966): Die Arten der Gattung *Diopogon* Jord. & Fourr. I. – Aus der botanischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien: 182-188.
- MAIER M., W. NEUNER & A. POLATSCHKEK** (2001): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg. – Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, Band 5: 664 pp.
- NATURKUNDLICHE ARBEITSGEMEINSCHAFT OSTTIROL** (2012): Sensationsfund im Nationalpark. - http://www.nago.or.at/index.php?option=com_content&view=article&id=15:botrychiumsimpler&catid=12&Itemid=109.
- PARRA SANCHEZ L. A.** (2008): *Agaricus* L. – Fungi Europei 1. – Ed. Candusso: 823 pp.
- POLATSCHKEK A.** (1997): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg. – Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, Band 1: 1024 pp.
- POLATSCHKEK A.** (1999): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg. – Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, Band 2: 1077 pp.
- POLATSCHKEK A.** (2000): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg. – Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, Band 3, 1354 pp.
- POLATSCHKEK A.** (2001): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg. – Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, Band 4: 1083 pp.
- POLATSCHKEK A. & W. NEUNER** (2013a): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg. – Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, Band 6, 973 pp.
- POLATSCHKEK A. & W. NEUNER** (2013b): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg. – Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, Band 6: 821 pp.
- STÖHR O., P. PILSL, F. ESSL, M. HOHLA & C. SCHRÖCK** (2007): Beiträge zur Flora von Österreich II. – Linzer Biol. Beitr. **39**: 155 – 292.
- STÖHR O., P. PILSL, F. ESSL, H. WITTMANN & M. HOHLA** (2009): Beiträge zur Flora von Österreich III. – Linzer Biol. Beitr. **41**: 1677 – 1755.
- STÖHR O., H. WITTMANN, C. SCHRÖCK, F. ESSL, G. BRANDSTÄTTER, M. HOHLA, C. NIEDERBICHLER & R. KAISER** (2006): Beiträge zur Flora von Österreich. – *Neilreichia* **4**: 139 – 190.
- STÖHR O.** (2011): Notizen zur Flora von Osttirol, IV. – Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen **4**: 419 – 433.
- STÖHR O. & W. DÄMON** (2007): Gefäßpflanzen. – in: GROS P., W. DÄMON & C. MEDICUS: Nationalpark Hohe Tauern, Tag der Artenvielfalt (Kaiser Dorfertal, Osttirol), Endbericht, Download unter www.hohetauern.at: 51-54.
- WILHALM T. & A. HILPOLD** (2006): Rote Liste der gefährdeten Gefäßpflanzen Südtirols. – *Gredleriana* **6**: 115- 198.

- WILHALM T., R. BECK, E. SCHNEIDER-FÜRCHAU & W. TRATTER** (2009): Ergänzungen und Korrekturen zum Katalog der Gefäßpflanzen Südtirols. – *Gredleriana* **9**: 105-118.
- WITTMANN H.** (2018): Blütenpflanzen und Farne. In: GROS P. & R. LINDNER (2018): Nationalpark Hohe Tauern – Tag der Artenvielfalt 2016, 29. bis 31. Juli 2016 – Tauerntal (Kärnten). – Ergebnisbericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern. Haus der Natur, Salzburg: 72 pp.
- WITTMANN H. & G. PFLUGBEIL** (2017): Beiträge zur Flora des Bundeslandes Salzburg IV. – Mitt. Haus der Natur, Salzburg **23**: 75-99.
- WITTMANN H., O. STÖHR, R. KRISAI, S. GEWOLF, S. FRÜHWIRTH, TH. RÜCKER & W. DÄMON** (2007a): Erfassung der Moore im Nationalpark Hohe Tauern in den Bundesländern Kärnten, Salzburg und Tirol - „Pflanzensoziologische und standortökologische Untersuchung der Moore des NPHT“. – Projektbericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern, 389 pp., 9 Karten, 1 Datenband, 1 Band Fotodokumentation, Datenbankabfragen hinsichtlich Management und Wertigkeit.
- WITTMANN H., O. STÖHR, R. KRISAI, S. GEWOLF, S. FRÜHWIRTH, TH. RÜCKER & W. DÄMON** (2007b): Vollerfassung und Dokumentation der alpinen Schwemmländer mit Pionierformationen des *Caricion bicoloris-atrofuscae* im Nationalpark Hohe Tauern. – Projektbericht im Auftrag des Nationalparks Hohe Tauern: 134 pp.
- ZIDORN C.** (2007): Floristische Notizen aus Osttirol (1). – *Ber. nat.-med. Verein Innsbruck* **94**: 51-55.

Zusammenfassung

Vom 14. bis 16. Juli 2017 fand im Hinteren Defereggental (Osttirol) der elfte "Nationalpark Hohe Tauern Tag der Artenvielfalt" statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung konnten zahlreiche Expert/-innen 1.542 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten (sowie untergeordnete systematische Einheiten) für das gesamte Untersuchungsgebiet nachweisen.

Vor dem Tag der Artenvielfalt 2017 waren für das Untersuchungsgebiet 887 Taxa in der Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern am Haus der Natur in Salzburg verzeichnet. Im Rahmen des „Nationalpark Hohe Tauern Tages der Artenvielfalt“ wurde eine Reihe neuer Organismengruppen berücksichtigt, für die es bislang verhältnismäßig wenige Fundmeldungen gab.

Besonders bemerkenswert war der Nachweis der Habichtskraut-Silbereule (*Autographa aemula*) im Schwarzachtal: Es handelt sich um den ersten Nachweis dieser Art in Osttirol! Die Habichtskraut-Silbereule kommt in Europa nur in den Alpen und den Pyrenäen vor, wo sie eher frischefeuchte Fluren der subalpinen Stufe besiedelt. Ebenfalls bemerkenswert war die Entdeckung der Moosart *Schistidium platyphyllum*: Es handelt sich um den ersten gesicherten Fund dieser Art für Osttirol! Hervorzuheben war auch der Fund des in den Alpen besonders selten nachgewiesenen Arktischen Wiesen-Champignons (*Agaricus aristocratus*) im Schwarzachtal. Diese Pilzart ist v. a. im hohen Norden Europas verbreitet. Auch die Flechtenart *Epiphloea byssina*, eine äußerst selten gefundene Art, wurde in der Umgebung der Patscher Alm beobachtet. Zu den außerordentlichen Raritäten, die im Rahmen des Tages der Artenvielfalt nachgewiesen wurden, zählt auch die Einfache Mondraute (*Botrychium simplex*), eine Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie: Ihr Nachweis ist daher auch auf nationaler und sogar internationaler Ebene als äußerst relevant zu betrachten.

Alle nachgewiesenen Arten wurden als Fundmeldungen in die Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern integriert, die durch den „Nationalpark Hohe Tauern Tag der Artenvielfalt 2017“ insgesamt einen gewaltigen Zuwachs von beinahe 5.600 Datensätzen erfuhr. **Insgesamt sind nun 1.886 Tier-, Pflanzen- und Pilzarten (sowie untergeordnete systematische Einheiten) im Untersuchungsgebiet nachgewiesen.**

Die Tage der Artenvielfalt im Nationalpark Hohe Tauern haben eindrucksvoll gezeigt, dass trotz der Beschränkung auf einen kurzen Zeitraum und einzelne Nationalparktäler bemerkenswert viele Arten durch die Expert/-innen nachgewiesen werden konnten. Insgesamt stammen etwa 45.000 Datensätze aus diesen Schwerpunkterfassungen, das sind derzeit ca. 13 % der Gesamtdatenmenge der Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern (Stand: Mai 2019).

Der Nationalpark Hohe Tauern führt gemeinsam mit dem Haus der Natur in Salzburg seit 2007 jährlich sogenannte „Tage der Artenvielfalt“ durch. Zu diesen Veranstaltungen reisen Wissenschaftler/-innen aus verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Fachrichtungen an, um ein abgegrenztes Gebiet innerhalb von zwei Tagen (bzw. Nächten) intensiv auf das Vorkommen von Arten zu untersuchen. Ohne die vielen engagierten Wissenschaftler/-innen wären die Nationalpark Hohe Tauern Tage der Artenvielfalt nicht möglich. Für Kost und Logis leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung der Fauna und Flora in den Hohen Tauern. Auch dieser Tag der Artenvielfalt hat gezeigt, dass ohne das ehrenamtliche Engagement und den freiwilligen Einsatz der Forscher/-innen die Tage der Artenvielfalt nicht so erfolgreich durchgeführt werden könnten. **Der Nationalpark Hohe Tauern und das Haus der Natur bedanken sie herzlich bei allen Teilnehmer/-innen des elften Tages der Artenvielfalt im Nationalpark Hohe Tauern 2017 im Oberen Defereggental.**

In Kooperation mit:

Medieninhaber und Herausgeber, Verleger:

Nationalparkrat Hohe Tauern, Kirchplatz 2, 9971 Matriei
Tel.: +43 (0) 4875 / 5112 | E-Mail: nationalparkrat@hohetauern.at
www.facebook.com/hohetauern | [#nationalparkhohetauern](https://twitter.com/nationalparkhohetauern)

www.hohetauern.at